

2cm

# HOOK®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE- WP

**COMPOSICIÓN:**

Buprofezin .....250 g/kg  
Aditivos..... csp 1kg

**Registro PQUA N° XXX-SENASA**

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



**AGRO KLINGE S.A.**

Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Formulado por:

**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China.

**Contenido Neto: 200g**

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

1,5cm

1,5cm

15,5cm



2cm

22 cm

20 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es de cuidado, no ingerir. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en la primeras 12 horas. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. No comer, beber o fumar durante la operación de la mezcla y aplicación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Grupo químico: No clasificado. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa. En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la molestia continua consulte con un médico. En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón. En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado, aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte con un médico.

**Nota:** No posee antídoto, el tratamiento es sintomático. Teléfono de emergencia: **CICOTOX:** 0800-13040 ó 3287398,

**ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita), Agro Klinge S.A.: (01) 6126565.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** HOOK es un insecticida inhibidor de síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, con buen efecto residual. Controla eficazmente los estados inmaduros (ninfas) de insectos como mosca blanca, queresas y otros. Además, produce una elevada infertilidad en los adultos tratados. Respeta los insectos benéficos, por lo que se recomienda para programas de Manejo Integrado de Plagas. **HOOK** Se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha- Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar **HOOK** (i.a. Buprofezin) hasta 02 aplicaciones por campaña como máximo y con una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días. Realizar las aplicaciones cuando se observe la presencia de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendadas

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/cil. 200 L		
NARANJO	"Mosca blanca"	<i>Aleurothrixus floccosus</i>	0,5	0,1	14	1
MANDARINO	"Queresa redonda"	<i>Selenaspidus articulatus</i>	1,0	0,2	14	1
OLIVO	"Queresa blanca móvil"	<i>Orthezia olivicola</i>	1,0	0,2	14	5
TOMATE	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0,5	0,15	1	1
PALTO	"Queresa del palto"	<i>Fiorinia fioriniae</i>	—	0,20-0,25	14	0,05
PIMIENTO	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0,2	—	3	2

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

® Marca Registrada



1,5cm

1,5cm

15,5cm

