

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

HOOK[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Buprofezin250 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

Registro PQUA N° 2268-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Av. El Derby 254. Int 306. Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto: 200 g

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante la operación de la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico: Tiadiazinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la molestia continua consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado, aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte con un médico.

Nota: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: **CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita), Agro Klinge S.A.: (01) 6410000**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos. Evitar su aplicación en época de desarrollo larval.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HOOK es un insecticida inhibidor de síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, con buen efecto residual. Controla eficazmente los estados inmaduros (ninfas) de insectos como mosca blanca, queresas y otros. Además, produce una elevada infertilidad en los adultos tratados. Respeta los insectos benéficos, por lo que se recomienda para programas de Manejo Integrado de Plagas. **HOOK** Se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha- Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **HOOK** (i.a. Buprofezin) hasta 02 aplicaciones por campaña como máximo y con una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días. Realizar las aplicaciones cuando se observe la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/200 L		
NARANJO	"Mosca blanca"	<i>Aleurothrixus floccosus</i>	0.5	0.1	14	1
MANDARINA	"Queresa redonda"	<i>Selenaspilus articulatus</i>	1.0	0.2	14	1
OLIVO	"Queresa blanca móvil"	<i>Orthezia olivicola</i>	1.0	0.2	14	5
TOMATE	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.5	0.15	1	1
PIMIENTO	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2		3	2
VID	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	--	0.2	31	0.02
PALTO	"Queresa del palto"	<i>Fiorinia florinae</i>	--	0.2 - 0.25	23	0.1
	"Escama latania"	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	--			

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

© Marca Registrada

