

**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

# HOOK<sup>®</sup>

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Buprofezin .....250 g/kg  
Aditivos..... csp 1kg

**Registro PQUA N° 2268-SENASA**

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



**AgroKlinge**

a member of ADAMA

**AGRO KLINGE S.A.**

Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China.

**Contenido Neto: 1 Kg**

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante la operación de la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Tiadiazinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa.
- En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la molestia continua consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado, aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte con un médico.

**Nota al médico:** No posee antídoto, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: **SAMU:106, Agro Klinge S.A.: (01) 641 0000**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para artrópodos benéficos. Evitar su aplicación en época de desarrollo larval.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HOOK es un

insecticida inhibidor de síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, con buen efecto residual. Controla eficazmente los estados inmaduros (ninfas) de insectos como mosca blanca, queresas y otros. Además, produce una elevada infertilidad en los adultos tratados. Respeta los insectos benéficos, por lo que se recomienda para programas de Manejo Integrado de Plagas. **HOOK** Se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha- Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar **HOOK** (i.a. Buprofezin) hasta 02 aplicaciones por campaña como máximo y con una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días. Realizar las aplicaciones cuando se observe la presencia de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendadas

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

| CULTIVO   | PLAGA                  |                                 | DOSIS |            | P.C.<br>(días) | L.M.R<br>(ppm) |
|-----------|------------------------|---------------------------------|-------|------------|----------------|----------------|
|           | NOMBRE COMÚN           | NOMBRE CIENTÍFICO               | kg/ha | kg/200 L   |                |                |
| NARANJO   | "Mosca blanca"         | <i>Aleurothrix floccosus</i>    | 0.5   | 0.1        | 14             | 1              |
| MANDARINA | "Queresa redonda"      | <i>Selenaspidus articulatus</i> | 1.0   | 0.2        | 14             | 1              |
| OLIVO     | "Queresa blanca móvil" | <i>Orthezia olivicola</i>       | 1.0   | 0.2        | 14             | 5              |
| TOMATE    | "Mosca blanca"         | <i>Bemisia tabaci</i>           | 0.5   | 0.15       | 1              | 1              |
| PIMIENTO  | "Mosca blanca"         | <i>Bemisia tabaci</i>           | 0.2   |            | 3              | 2              |
| VID       | "Cochinilla harinosa"  | <i>Planococcus ficus</i>        | --    | 0.2        | 31             | 0.02           |
| PALTO     | "Queresa del palto"    | <i>Fiorinia floriniae</i>       | --    | 0.2 - 0.25 | 23             | 0.1            |
|           | "Escama latania"       | <i>Hemiberlesia lataniae</i>    | --    |            |                |                |

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

© Marca Registrada

