“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

HOOK®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE- WP

COMPOSICIÓN:

Buprofezin .....250 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Este producto es de cuidado, no ingerir.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-No comer, beber o fumar durante la operación de la mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: No clasificado.
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa.
-En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
-En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la molestia continua consulte con un médico.
-En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar ventilado, aplicar respiración artificial de ser necesario. Consulte con un médico.

Nota: No posee antídoto, el tratamiento es sintomático.
Teléfono de emergencia: **CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398,**
ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita), Agro Klinge S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, destruya este envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-Peligroso para artrópodos benéficos. Evitar su aplicación en época de desarrollo larval.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HOOK es un insecticida inhibidor de síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, con buen efecto residual. Controla eficazmente los estados inmaduros (ninfas) de insectos como mosca blanca, queresas y otros. Además, produce una elevada infertilidad en los adultos tratados. Respeta los insectos benéficos, por lo que se recomienda para programas de Manejo Integrado de Plagas. **HOOK** Se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, utilizando la suficiente cantidad de agua para cubrir uniformemente el follaje.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha- Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **HOOK** (i.a. Buprofezin) hasta 02 aplicaciones por campaña como máximo y con una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días. Realizar las aplicaciones cuando se observe la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/cil. 200 L		
NARANJO	“Mosca blanca"	*Aleurothrixus floccosus*	0,5	0,1	14	1
MANDARINO	“Queresa redonda"	*Selenaspidus articulatus*	1,0	0,2	14	1
OLIVO	“Queresa blanca móvil"	*Orthezia olivicola*	1,0	0,2	14	5
TOMATE	“Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	0,5	0,15	1	1
PALTO	“Queresa del palto”	*Fiorinia fioriniae*	--	0,20-0,25	14	0,05
PIMIENTO	“Mosca blanca”	*Bemisia tabaci*	0,2	--	3	2

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

Registro PQUA Nº XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
AgroKlinge

AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Formulado por:
Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square,Nº 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, China.

® Marca Registrada

Contenido Neto: 25 Kg

N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**