

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a una zona con aire fresco y manténgalo en reposo y abrigado. Luego solicite instrucciones médicas.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 10 - 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel: lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Trasladar de inmediato al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 0800-1-0200.**
- **NOTA AL MÉDICO:** NEE MIX 4.5 no tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en el mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Neemix® 4.5

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Azadirachtina..... 45 g/L

Aditivos.....

PBUA N° 133 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Formulador:

CERTIS USA

9145 Guilford Road
Suite 175-Columbia-EE.UU

Importado y distribuido por:

hortus

Calle Suare 270 Ab. Lima. Perú.
Tel: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 2010163721 / R.U.N° 141097

Contenido Neto : 250 ml

Lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEEMIX 4.5 es un nuevo insecticida biológico extraído naturalmente de las semillas de árbol de Neem. La azadirachtina es su principal componente, la cual es reconocida como el limonenoide de mayor actividad y espectro sobre distintas especies de insectos plagas. NEE MIX 4.5 actúa bloqueando la síntesis de ecdisona (hormona de crecimiento), interrumpiendo la alimentación, deteniendo el crecimiento y reproducción en los insectos. Actúa por ingestión, pudiendo emplearse para agricultura orgánica y/o convencional. NEE MIX 4.5 es repelente (antiguasativo) de acción translocante: los tejidos de las plantas llegan a ser desagradables a los insectos, algunos especies prefieren morir de hambre antes de comer los folíolos tratados. NEE MIX 4.5 reduce la oviposición de los insectos plaga.

NEEMIX 4.5 debe ser recomendado especialmente para el control de larvas y ninfas de insectos plagas. Para las aplicaciones el pH del agua debe acidificarse ligeramente a 6.0 y su uso debe realizarse en horas de baja inselación como muy temprano en la mañana o pasadas las 4:00 p.m. Se recomienda usar la dosis sugerida por hectárea calibrando previamente los equipos para una cobertura completa de cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | P L A G A S | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | (L/ha) | (ml/200L) | | |
| Alcachofa | Mosca Minadora | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 0.25 - 1.0 | 125 - 500 | | |
| | Trips (**) | <i>Trips tabaci</i> | 0.25 - 0.5 | 125 - 250 | | |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes(***) | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 0.25 - 1.0 | 125 - 500 | | |
| | Mosca Minadora | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 0.5 - 1.0 | 90 - 170 | | |
| Holantao | Minador de los cítricos (**) | <i>Phyllocnistis citrella</i> | 0.25 - 0.5 | 125 - 250 | | |
| Mandarina | Mosca blanca (*) | <i>Bemisia tabaci</i> | 1 | 350 | | |
| Páprika | Mosca minadora | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 0.25 - 0.5 | 100 - 200 | N.A. | N.A. |
| | Mosquilla de los brotes(***) | <i>Prodiplosis longifolia</i> | 0.25 - 0.5 | 100 - 200 | | |
| | Enrollador de hojas | <i>Lineodes integra</i> | 0.5 - 1.0 | 170 - 340 | | |
| Tomate | Mosca blanca (**) | <i>Bemisia tabaci</i> | 1.0 | 350 | | |
| | Mosca minadora | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | 0.25 - 0.5 | 90 - 180 | | |
| Vid | Trips | <i>Frankliniella occidentalis</i> | 2 | 400 | | |
| Palto | Mosca blanca | <i>Aleurodicus julekiae</i> | - | 200 - 300 | | |

P.C.: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm. N.A.: No aplica.

(*) Las dosis sugeridas por 200L son referenciales y están de acuerdo a previa calibración de equipos para abarcar con la fumigación todo el cultivo. (**) Se recomienda aplicar en mezcla con un aceite vegetal a la dosis de 0.5 - 0.75 / 200L. (***) Realizar aplicaciones dirigidas al brote con bajas dosis y en mezcla con aceite vegetal a intervalos de 7 días y/o rotando con otros productos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Debido al modo de acción de NEE MIX 4.5 se recomienda realizar dos aplicaciones consecutivas a intervalos de 7 a 9 días con la finalidad de romper el ciclo de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO: 4 horas.

COMPATIBILIDAD: es compatible con plaguicidas y fertilizantes foliares comúnmente usados. En caso de duda se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

V20201020



PRECAUCIÓN

