

Atajal[®]

250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Quinclorac 250 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX- SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254 Of 503.
 Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd.
 Yangkou Chemical Cluster Area
 Rundong County, Jiangsu, China

CONTENIDO NETO: **4 Litros**
 Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CARA

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Quinolinecarboxylic acid.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de Emergencia:
 CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX 0800-1-3040; ESSALUD en línea (01)411-8000 anexo 4; ADAMA Agriculture Perú: (01)641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicar debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Atajal 250 SC es un herbicida sistémico, selectivo post-emergente, recomendado para el control de malezas cyperáceas, gramíneas y hoja ancha en el cultivo de arroz.
 Atajal 250 SC puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización terrestre, utilizando boquillas de abanico plano.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>	1.0	40	5
	"Coquito"	<i>Cyperus difformis</i>			
	"Coca"	<i>Cyperus esculentus</i>			
	"Pastito de dios"	<i>Briza minor</i>			
	"Caminadora"	<i>Ischaemum rugosum</i>			
	"Piso"	<i>Eleocharis geniculata</i>			
"Oreja de elefante"	<i>Heteranthera limosa</i>				
"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>				

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo (01) aplicación por campaña, considerado como máximo (01) una campaña por año.
 Realizar la aplicación cuando el arroz se encuentra en macollamiento y las malezas tengan 2-4 hojas verdaderas

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No es compatible con productos de fuerte reacción alcalina o ácida. Es compatible en mezcla con propanil y/o bispyribac sodium. También se puede aplicar con insecticidas organofosforados y carbamatos. No hacer triple mezcla quinclorac + propanil + insecticidas.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados en la etiqueta. No realizar la siembra de apio, cucurbitáceas, papa y zanahoria dentro del primer año posterior a la aplicación de quinclorac. No sembrar tomate en campos tratados con quinclorac durante 24 meses.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONTRACARA