

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# CAMPO-AZOX

## 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**  
Azoxystrobin ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2286 - SENASA

**Titular de Registro:**  
**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**  
Tomas Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito Magdalena Del Mar,  
Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847



**Formulador:**  
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

**Importador y Distribuidor :**  
**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**  
omas Ramsey N° 930, Oficina 1210, Distrito Magdalena Del Mar,  
Lima, Perú  
Teléfono: (01) 6360847

**N° de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

Contenido Neto: 1 KG

NO CORROSIVO                      NO INFLAMABLE                      NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es nocivo por inhalación, evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañese con abundante agua y jabón.
- Cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Realizar la aplicación, siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Azoxystrobin: Estrobirulina.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y hoja informativa.
- En caso de ingestión, no provoque el vomito, ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, traslade al paciente en una zona ventilada.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 6360847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas altas o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**CAMPO-AZOX 50 WG** es un fungicida del grupo de las estrobirulinas sistémico y trnaslaminar, con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares.  
**CAMPO-AZOX 50 WG** actua bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento miceliar con un prolongado efecto residual.  
**CAMPO-AZOX 50 WG** se emplea en un volumen de agua que permita una optima cobertura del follaje.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Realizar como máximo (2) aplicaciones por campañas por año para el cultivo de pimiento.  
Realizar máximo (1) aplicación por campaña por año para el cultivo de arándano, vid y alcachofa.  
Se recomienda rotar, entre aplicaciones, con plaguicidas diferentes modos de acción.

**PERÍODO DE REINGRESO**  
Puede reingresar al área tratada sin equipo de protección 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
**CAMPO-AZOX 50 WG** es incompatible con productos fitosanitarios de uso común.

**FITOTOXICIDAD**  
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Consulte con un ingeniero agrónomo

| Cultivo   | Plaga                   |                              | Dosis       |             | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|           | Nombre común            | Nombre científico            | Kg/200L     | Kg/Ha       |           |           |
| Pimiento  | Mancha negra de la hoja | <i>Alternaria alternata</i>  | -           | 0.15        | 3         | 3         |
| Arándano  | Cabeza de clavo         | <i>Alternaria tenuissima</i> | -           | 0.30 - 0.35 | 1         | 5         |
|           | Erysiphe                | <i>Erysiphe elevata</i>      | 0.10 - 0.12 | 0.30 - 0.36 | 1         | 5         |
| Vid       | Oidiosis                | <i>Erysiphe necator</i>      | 0.1         | 0.45 - 0.50 | 14        | 2         |
| Alcachofa | Oidiosis                | <i>Leveillula taurica</i>    | 0.08        | 0.16*       | 1         | 5         |

\* Gasto de agua: 400 L/Ha  
PC: Periodo de carencia  
LMR: Limite máximo de residuos

