

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazolobenzothiazole.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consiente. No provoque vómito.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Aplicar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
UPL PERU S.A.C.: (01) 611 0831
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

KRIS
75 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Tricyclazole.....750 g/Kg
Aditivos.....c.s.p.1Kg

Reg. PQUA N° 1398 - SENASA

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3
San Felipe) Jesús María - Lima.
Teléfono (01) 611 0831

Formulador:

LAOTING YOLOO BIO - TECHNOLOGY CO., LTD.
No. A-3 Tianjin Road, Looting Economic Development
Zone, Hebei Province, 063600, China.
Teléfono: +86-0315-5225666.

Importador y Distribuidor:

AGRITOP S.A.C
Av. Los Gorriones 130 Urb. La Campiña,
Chorrillos-Lima - Perú.
Telf. 719-1717 / 719-1718

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

CONTENIDO NETO: 25Kg.

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KRIS 75 WP es un fungicida sistémico, que actúa a nivel de la biosíntesis del ergosterol, deteniendo por ello el crecimiento del hongo.

KRIS 75 WP, se prepara diluyendo la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. Agitar constantemente para aplicar al follaje, realizando una distribución homogénea del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Queinado del arroz	Pyricularia oryzae	0.25	30	1

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando se advierta los primeros signos de la enfermedad.
- Como máximo aplicar 1 vez por campaña/año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- Dosis máxima: 0.25 Kg/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de transcurridos 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

KRIS 75 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

KRIS 75 WP no causa fitotoxicidad en el cultivo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

