

# FORTITON<sup>®</sup>

## 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

### COMPOSICIÓN:

Linuron.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1kg

**Registro PQUA N° 2290 - SENASA**



**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa  
La Molina, Lima, Perú  
Teléfono: 499 7831

**Formulado por:**

**POINT AGRO - CHINA LTD.**

Rm1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road,  
Jiangyin, Jiangsu, China

Contenido Neto: **1 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa moderada irritación a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, de persistir los síntomas, acudir al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

### Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0800-13040  
ESSALUD: 411-8000 opción 4

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y dépositela en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Mejorar la capacidad retentiva del suelo mediante la incorporación de materia orgánica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**FORTITON 50 WP** es un herbicida sistémico y selectivo para cultivos de hoja ancha y angosta. Se aplica en pre y postemergencia temprana de las malezas.

Para su aplicación, emplear agua con pH neutro, luego llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, después añadir el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico, utilizando boquillas de amplia cobertura.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA Y APLICACIÓN:

En Preemergencia al cultivo y a la maleza. Pre siembra (incorporado) Post emergencia temprana, al cultivo y a la maleza (de hoja angosta no más de 1.5 hojas). Es recomendable que al momento de la aplicación el suelo se encuentre húmedo. Realizar una aplicación por campaña como máximo.

### PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

Por razones de manejo del cultivo, **FORTITON 50 WP** debe aplicarse de manera única. No realizar mezclas con otros productos agroquímicos.

### FITOTOXICIDAD:

**FORTITON 50 WP** no es fitotóxico usado a la dosis recomendada en esta etiqueta. Sin embargo, no debe sembrarse cultivos susceptibles en un campo tratado con linuron durante los cuatro (04) meses posteriores a la cosecha.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas a la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/ha	g/Cil. 200 L		
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	300	150	*	0.05
	Rajamano	<i>Sida spinosa</i>				
	Verdolaqa	<i>Portulaca oleracea</i>				
Alcachofa	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	800	400	*	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>				
	Verdolaqa	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>				
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>				
Espárrago	Paico	<i>Chenopodium album</i>	-	500	1	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>				
	Verdolaqa	<i>Portulaca oleracea</i>				

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

PC: Período de Carencia en días. \* El producto solo se debe aplicar en la etapa de presiembra o en la instalación del cultivo.

