

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa moderada irritación a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni trasportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Ureas**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; de persistir los síntomas, acudir al médico.
- El médico debe instituir un tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 328-7700 ESSALUD: 411-800(opción 4) CIPROSQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Mejorar la capacidad retentiva del suelo mediante la incorporación de materia orgánica.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

FORTITON®

50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE -WP

COMPOSICIÓN:

Linuron.....500 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro, Importado Y
Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto 304 Urb.
Santa Patricia II Etapa.
La Molina, Lima-Perú.
Telf.: (01) 348-1018/(01)349-9609

Formulado Por:

POINT AGRO-CHINA LTD.

Rm1206 Kaisa Plaza, 1091 East Renmin
Road, Jiangyin Jiangsu 214400
China

Contenido Neto: **500 g**

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORTITON 50 WP es un herbicida sistémico y selectivo para cultivos de hoja ancha y angosta. Se aplica en pre y post-emergencia temprana de las malezas

Para su aplicación, emplear agua con pH neutro, luego llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, después añadir el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánica, utilizando boquillas de amplia cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/Cil. 200L		
Cebolla	Yuyo Rajamano Verdolaga	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Sida spinosa</i> <i>Portulaca oleracea</i>	300	150	*	0.05
Alcachofa	Yuyo Amor seco Hierba de gallinazo Chamico Capuli cimarron Verdolaga Pega pega Hierba mora	<i>Amaranthus bubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Solanum nigrum</i>	800	400	*	0.05
Espárrago	Paico Pata de gallina Hierba mora Verdolaga	<i>Chenopodium álbum</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	-	500	1	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm. PC: Período de Carenia en días. * El producto solo se debe usar en la etapa de presembrado o en la instalación del cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En Pre- emergencia al cultivo y a la maleza. Pre siembra (incorporado). Post-emergencia temprana, el cultivo y a la maleza (de hoja angosta no más de 1.5 hojas). Es recomendable que al momento de la aplicación el suelo se encuentre húmedo. Realizar una aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Por razones de manejo del cultivo, **FORTITON 50 WP** debe aplicarse de manera única. No realizar mezclas con otros productos agroquímicos.

FITOTOXICIDAD

FORTITON 50 WP no es fitotóxico usado a la dosis recomendada en esta etiqueta. Sin embargo, no debe sembrarse cultivos susceptibles en un campo tratado con linuron durante los cuatro (04) meses posteriores a la cosecha.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

