

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa moderada irritación a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni trasportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Ureas**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; de persistir los síntomas, acudir al médico.
- El médico debe instituir un tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 328-7700 ESSALUD: 411-800 (opción 4)

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Mejorar la capacidad retentiva del suelo mediante la incorporación de materia orgánica.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

# FORTITON®

## 50 WP

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE -WP

#### COMPOSICIÓN:

Linuron.....500 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 2290 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A

Urb. Santa Patricia II Etapa

La Molina, Lima, Perú

Teléfono: 499 7831



Formulado Por:

**POINT AGRO-CHINA LTD.**

Rm1206 Kaisa Plaza, 1091 East Renmin

Road, Jiangyin Jiangsu 214400

China

Contenido Neto: **500 g**

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FORTITON 50 WP** es un herbicida sistémico y selectivo para cultivos de hoja ancha y angosta. Se aplica en pre y post-emergencia temprana de las malezas

Para su aplicación, emplear agua con pH neutro, luego llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, después añadir el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánica, utilizando boquillas de amplia cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/Cil. 200L		
Cebolla	Yuyo Rajamano Verdolaga	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Sida spinosa</i> <i>Portulaca oleracea</i>	300	150	*	0.05
Alcachofa	Yuyo Amor seco Hierba de gallinazo Chamico Capuli cimarron Verdolaga Pega pega Hierba mora	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Solanum nigrum</i>	800	400	*	0.05
Espárrago	Paico Pata de gallina Hierba mora Verdolaga	<i>Chenopodium album</i> <i>Elyusine indica</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	-	500	1	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm. PC: Período de Carenia en días. \* El producto solo se debe usar en la etapa de siembra o en la instalación del cultivo.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En Pre-emergencia al cultivo y a la maleza. Pre siembra (incorporado). Post-emergencia temprana, el cultivo y a la maleza (de hoja angosta no más de 1.5 hojas). Es recomendable que al momento de la aplicación el suelo se encuentre húmedo. Realizar una aplicación por campaña como máximo.

#### PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Por razones de manejo del cultivo, **FORTITON 50 WP** debe aplicarse de manera única. No realizar mezclas con otros productos agroquímicos.

#### FITOTOXICIDAD

**FORTITON 50 WP** no es fitotóxico usado a la dosis recomendada en esta etiqueta. Sin embargo, no debe sembrarse cultivos susceptibles en un campo tratado con linuron durante los cuatro (04) meses posteriores a la cosecha.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

