

FORTITON[®]

50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Linuron.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 2290 - SENASA



INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: 499 7831

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.

Rm1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road,
Jiangyin, Jiangsu, China

Contenido Neto: **25 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa moderada irritación a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarse con abundante agua fresca durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, de persistir los síntomas, acudir al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 411-8000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y deposítela en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Mejorar la capacidad retentiva del suelo mediante la incorporación de materia orgánica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FORTITON 50 WP es un herbicida sistémico y selectivo para cultivos de hoja ancha y angosta. Se aplica en pre y postemergencia temprana de las malezas.

Para su aplicación, emplear agua con pH neutro, luego llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, después añadir el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico, utilizando boquillas de amplia cobertura.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En Preemergencia al cultivo y a la maleza. Pre siembra (incorporado) Post emergencia temprana, al cultivo y a la maleza (de hoja angosta no más de 1.5 hojas). Es recomendable que al momento de la aplicación el suelo se encuentre húmedo. Realizar una aplicación por campaña como máximo.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Por razones de manejo del cultivo, **FORTITON 50 WP** debe aplicarse de manera única. No realizar mezclas con otros productos agroquímicos.

FITOTOXICIDAD:

FORTITON 50 WP no es fitotóxico usado a la dosis recomendada en esta etiqueta. Sin embargo, no debe sembrarse cultivos susceptibles en un campo tratado con linuron durante los cuatro (04) meses posteriores a la cosecha.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas a la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/ha	g/Cil. 200 L		
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	300	150	*	0.05
	Rajamano	<i>Sida spinosa</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
Alcachofa	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	800	400	*	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>				
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>				
	Paico	<i>Chenopodium album</i>				
Espárrago	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	-	500	1	0.05
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).

PC: Período de Carencia en días. * El producto solo se debe aplicar en la etapa de pre siembra o en la instalación del cultivo.

