

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es toxico por ingestión. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 21 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa usada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonoglicina

- En caso de intoxicación o ingestión lleve al paciente inmediatamente al medico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vomito.
- En caso de contacto con los ojos, lavelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los parpados.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (gratuito)

Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4
AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 01 425-6487, 01 261-5227.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio..



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas fráticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear toda las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TIMBA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Glifosato, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos csp. 1 L

Registro PQUA N° 2001 - SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C

Jr. Sáenz Peña N° 344 -105, Magdalena del Mar, Lima 17 – Perú
Teléfono: 425-6487 / 261-5227

Formulado por: SINON CORPORATION

23 Sec. 1, Mei Chuan W. Rd. Taichung, 40357 P.R.C. China.
Telf: 886-4-2693-3841 / FAX: 885-4-2693-37-13

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N°344 - 105, Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: **200 L.**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TIMBA es un herbicida sistémico, no selectivo post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para formar proteínas estructurales y metabolitos esenciales en el desarrollo de las malezas.

Preparar la mezcla o tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación. El suelo debe estar en capacidad de campo

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
MANDARINA	Grama china Coquito Amor seco	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Bidens pilosa</i>	4	4	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

TIMBA debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año). Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la enfermedad.

Como máximo aplicar 2 veces por campaña/año. Con un intervalo de 14 días y previa evaluación.

Máximo aplicar 4.0 L/ha; Rotar con otros herbicidas para evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.


COMPATIBILIDAD: compatible con otros plaguicidas excepto con los de reacción alcalina u oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

TIMBA es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

