

NEOZEB® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb.....800 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 171 - SENASA

Titular del Registro:

NEOAGRUM S.A.C.

Pj. Camino de Acceso N° 02 – Urb. Parcelación

Cajamarquilla, Lurigancho – Lima – Perú.



Importado y distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 703.

Edificio del Park II. Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444



Contenido neto: 25 kg

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province - CHINA



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

COLORES: (CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES)		
NEGRO Texto	PANT. 293 C Banda Toxicológica	PANT. 206 Nombre Comercial Pictograma Inflamable

COLORES LOGO NEOAGRUM	
PANT. 343 Verde Oscuro	PANT. 1375 Sol Pictograma Explosivo

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritación ocular: pomadas o colonias oftálmicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática superficial.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NEOZEB 80 PM es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos. Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agítándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

NEOZEB 80 PM no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (g/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Algodón	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	400-500	28	2
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	400-500	28	0.2
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	600-800	28	0.1
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	600	28	0.1
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	750	14	2
Naranja	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400-500	28	5
Papa	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	28	0.2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>	400-500	28	
Pimiento	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	750	7	5
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	750	7	
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	10	2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>	400-500	10	2.5
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	1.5

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

