150 mm (5.9")

205 mm (8")

5 mm

190 mm

8 | 134 mm | 8

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MONCUT®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Flutolanil..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2291-SENASA

Importador y Distribuidor:

AgroKlinge
A member of ADAMA

Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Nihon Nohyaku Co. Ltd
Kyobashi OM Building, 19-8, Kyobashi 1-chrome,
Chuo-Ku, Tokyo 104-0031, Japón

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. EL Derby 254. Int 306.
Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 250 g

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Oxathiin
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

• **Nota al médico:**
ANTÍDOTO: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
• **Teléfono de emergencia:** SAMU: 106;
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: MONCUT es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, principalmente contra hongos patógenos de la clase Basidiomicetos como *Rhizoctonia solani*. **MONCUT** se emplea como desinfectante de semillas y/o en aspersiones dirigidas al cuello de la planta.

Tratamiento de Semilla por impregnacion: Espolvorear la dosis indicada de **MONCUT** sobre la semilla previamente humedecida con suficiente cantidad de agua, mezclar uniformemente hasta cubrir totalmente la semilla.

Tratamiento de semilla por inmersión (semilla de papa): : Disolver 50 a 100 g de **MONCUT** en 100 litros de agua para 1000 kg de semilla. Sumergir la semilla por 2 a 3 minutos en esta solución. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

Aspersiones dirigidas: Aplicar **MONCUT** previa mezcla con agua, en aspersiones dirigidas al cuello de planta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En tratamiento a la semilla previamente a la siembra. En aspersiones dirigidas, aplicar **MONCUT** cuando se observen las primeras plantas con los síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de ser necesario.

PERIODO DE REINGRESO: 48 horas, en aplicaciones por aspersión.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Semilla	Enfermedad		Desinfección de semilla	Aspersión al cuello de la planta		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/kg de semilla	g/moch. 20L	g/cil. 200 L		
Algodón	"Chupadera fungosa"	*Rhizoctonia solani*	1 a 2	20	200	N.A.	N.A.
Papa	"Chupadera fungosa"	*Rhizoctonia solani*	50-100g/100 L agua para 1000 kg semilla	-----	-----	N.A.	0.1
Ajo y cebolla	"Pudrición blanca"	*Sclerotium cepivorum*	1 a 2	10 – 20	100-200	40	2.0
Frijol y maní	"Chupadera fungosa"	*Rhizoctonia solani*	1 a 2	20	200	40	0.5
Tomate, ají y vainita	"Chupadera fungosa"	*Rhizoctonia solani*	1 a 2	10 – 20	100-200	N.A.	2.0

N.A.= No aplica por ser tratamiento a la siembra
P.C. = Periodo de carencia **L.M.R. = Límite máximo de residuos**

® Marca Registrada

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA