

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# MONCUT®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Flutolanil..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2291-SENASA

Importador y Distribuidor:



A member of ADAMA

Agro Klinge S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Telf: (01) 641-0000

**Formulador:**

Nihon Nohyaku Co. Ltd  
Kyobashi OM Building, 19-8, Kyobashi 1-chrome,  
Chuo-Ku, Tokyo 104-0031, Japón

**Titular del Registro:**

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.  
Av. EL Derby 254, Int 306.  
Santiago de Surco.  
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:

**Contenido Neto: 1 kg**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

Cara

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Oxathiin
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- **Nota al médico:** ANTÍDOTO: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.  
- **Teléfono de emergencia:** SAMU: 106;  
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MONCUT** es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa principalmente contra hongos patógenos de la clase Basidiomicetos como *Rhizoctonia solani*. MONCUT se emplea como desinfectante de semillas y/o en aspersiones dirigidas al cuello de la planta.

**- TRATAMIENTO DE SEMILLA POR IMPREGNACIÓN:**

Espolvorear la dosis indicada de MONCUT sobre la semilla previamente humedecida con suficiente cantidad de agua, mezclar uniformemente hasta cubrir totalmente la semilla.

**- TRATAMIENTO DE SEMILLA POR INMERSIÓN (SEMILLA DE PAPA):** Disolver 50 a 100 g de MONCUT en 100 litros de agua para 1000 kg de semilla. Sumergir la semilla por 2 a 3 minutos en esta solución. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

**- ASPERSIONES DIRIGIDAS:**

Aplicar MONCUT previa mezcla con agua, en aspersiones dirigidas al cuello de planta.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

En tratamiento a la semilla, aplicar previamente a la siembra. En aspersiones dirigidas, aplicar MONCUT cuando se observen las primeras plantas con los síntomas de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de ser necesario.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar a áreas tratadas sin equipo de protección personal durante las primeras 48 horas después de las aplicaciones por aspersión.

**COMPATIBILIDAD:**

Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Enfermedad		Desinfección de semilla (g/kg de semilla)	Aspersión al cuello de la planta		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico		g/20L	g/200L		
Algodón	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1 a 2	20	200	N.A.	N.A.
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	50 - 100g/100L agua para 1000 kg de semilla	-	-	N.A.	0.1
Ajo y cebolla	Pudrición blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	1 a 2	10 - 20	100 - 200	40	2.0
Frijol y maní	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1 a 2	20	200	40	0.5
Tomate, ají y vainita	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1 a 2	10 - 20	100 - 200	N.A.	2.0

P.C. : Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A. : No aplicable por ser tratamiento a la siembra  
© Marca Registrada



Contracara

Dimensiones 210 mm x 150 mm