27.01.20 Tamaño: 18X10.5X6.5 cms

BENAXIL® 73

BENAXIL® 73

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Benalaxyl	80.00 g/kg
Mancozeb	650.00 g/kg
Etilentiorea (ETU)	0.38 g/kg
Aditivos	270.00 g/kg

PQUA N° 22-SENASA

Titular Del Registro: **SERFI S.A.**

Formulado por:
FARMEX S.A.
Av. Santa Josefina 467
Urb. Las Vegas
Puente Piedra
Lima - Perú

Distribuido por:
Serfi
Av. República de Panamá Nº 2577
La Victoria, Lima - Perú
Teléfono: 51(1) 710-4000

Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 500 g

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Es un fungicida de actividad sistémica y de contacto con acción preventiva y curativa para el control de "chromistas". Una característica de BENAXIL 73 es su capacidad de actuar al interior de los tejidos de los diversos órganos de los vegetales al ser absorvido por las yemas, hojas, ramas herbáceas y raíces de las plantas. Su comportamiento endoterápico le permite actuar en el interior de los tejidos de las plantas, además de actuar contra los patógenos en la superficie de los órganos de las plantas. No usar en ambientes cerrados como invernaderos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Llene de agua el recipiente hasta un tercio del mismo y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Po último complete con agua el recipiente y continúe agitando.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar el contenido en otros envases ni reutilizarlos.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto no puede ser usado en presencia de personas que mantengan tratamiento para epilepsia, especialmente fenobarbital.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- El producto no puede ser usado por personas que tengan problema de tiroides o están bajo tratamiento de afecciones tiroideas.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Ditiocarbamato, Acylalanine
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CETOX: Tel.: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
- En caso de ingestión provocar el vómito lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- En caso de intoxicación no dar de beber leche ni bebidas alcohólicas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturandolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Es peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No aplicar a menos de 2 metros de fuentes de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	Hielo fungoso o rancha	*Phytophthora infestans*	2.50	28	1
Tomate	Hielo fungoso o rancha	*Phytopthora infestans*	1.50	28	1
Cebolla	Mildiú	*Peronospora destructor*	1.00 - 2.00	28	1
Zapallo	Mildiú	*Pseudoperonospora cubensi*	1.25 - 1.50	28	1
Páprika	Pudrición tallo y frutos	*Phytophtora capsici*	1.00	15	1
Vid	Mildiú	*Plasmopara viticola*	1.0 - 1.5	28	1

P.C.: Período de carencia **L.M.R.: Límite máximo de residuos (parte por millón)**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Puede aplicarse cuando las condiciones medio ambientales favorezcan la infección de las plantas por el patógeno. Se puede aplicar hasta dos veces por campaña has ta 4 veces por año y con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al área antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD
No se han obserbado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone 293 C	Black k100	Pantone 355 C	Pantone 199 C