

13 cm

18 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **TOP COP** es un fungicida biológico a base de azufre y sulfato de cobre; posee acción de contacto.
- **Modo de acción:** En aplicación preventiva impide el establecimiento y proliferación de la enfermedad. En aplicación curativa causa la muerte del patógeno causante de la enfermedad.
- **Mecanismo de acción:** El azufre por proceso de oxidación produce Tetratolano, intermediario tóxico para el patógeno. La cantidad producida está relacionada con el área superficial disponible para la oxidación. Cuanto más pequeño el tamaño de partícula del azufre, mayor área disponible para la oxidación y menor cantidad de azufre será necesario. El azufre elemental a través de sus vapores entra en contacto directo con las esporas y otros tejidos fungosos, previniendo o inhibiendo su germinación o su crecimiento. Por otro lado, la acción fungitóxica de Cobre se atribuye a su capacidad de desnaturar las proteínas celulares y desactivar sistemas enzimáticos en hongos y bacterias.
- **Preparación y aplicación:** TOP COP se aplica en pulverización (manual o mochila). Llenar el tanque con agua hasta la mitad. Verter la dosis recomendada de TOP COP. Agitar la mezcla hasta formar una solución uniforme. Adicionar la cantidad de agua restante hasta completar la capacidad del recipiente. Agitar y se prepara la solución.
- **Aplicar** durante las primeras horas de la mañana o a tardes cuando la temperatura es baja y no haya viento a fin de prevenir la deriva de la solución de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

PC: Periodo de carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm) N.A: No Aplica

- **Vid:** Realizar una aplicación. Aplicación preventiva o curativa cuando el nivel de infección fúngica esté en estadios iniciales, en etapa de brotamiento o inicio de fructificación. Realizar la aplicación con volumen de agua suficiente que cubra uniformemente toda la planta y a ambos lados de la hilerla.
- **Arándano:** Una aplicación a inicio de floración. Realizar 3 a 4 aplicaciones por campaña. Emplee suficiente volumen de agua para cubrir uniformemente toda la planta. Aplicar a ambos lados de la hilerla.
- **Arroz:** Realizar dos aplicaciones, estado de embuchamiento y emergencia de la panícula. Intervalo de 10 días.
- **Palto:** Realizar 1 a 2 aplicaciones por campaña al año. Una aplicación en manejo preventivo del hongo y aplicado al inicio de la floración. Bajo condiciones de alta presión del hongo, realizar dos aplicaciones, previa evaluación.
- **Esparágno:** Aplicación preventiva, al crecimiento de brotes. Dos aplicaciones por campaña a intervalo de 10 días. Rango de pH de la solución: 5 a 7.

12 horas

- No es compatible con aceites minerales o vegetales, previéndose la aplicación en conjunto. No aplicar ningún producto que contenga azufre dos semanas antes o después de la aplicación de aceites. El resultado de la aplicación en conjunto de azufre con aceites se muestra con síntomas de fitotoxicidad en los frutos y en el follaje, potenciado bajo condiciones de altas temperaturas.
- No mezclar con agentes fuertemente oxidantes, nitrato de amonio.

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Formulador



Distribuidor: Stoller Perú S.A.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 20 L

11.49 cm

18 cm

