

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO",  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

##### • Grupo químico: Pyrethroid

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel. Retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación , retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: éste producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106, AGROLAC ANDINA S.A.C.: (01) 363-8659

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recuperado inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# LAMBDALAC

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### INSECTICIDA AGRICOLA

### Cápsulas en Suspensión (CS)

#### Composición:

Lambda-cyhalothrin..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2280 - SENASA

#### Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N°344 Dpto. 105 Magdalena del Mar Lima 17 - Perú  
Telf: +(511) 363-8659

#### Formulado por: SINON CORPORATION

Dirección: 23, Sec 1, Mei Chuan W. Rd., Taichung, 40357 Pudong Taiwan, R.O.C.  
Telf: 886-4-2372618, Fax.: 886-4-23750574

#### Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N° 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar Lima 17 - Perú.  
Telf.: +(511) 363-8659

Contenido Neto: **5 L**

N° de Lote.  
F. de Form.  
F. de Venc.



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LAMBDALAC es un insecticida piretroide no sistémico, moderadamente peligroso que actúa por ingestión y contacto, mediante la generación de un potencial de acción en las células neuronales por la despolarización de la membrana, lo que implica la apertura de canales de sodio de la membrana celular interrumpiendo el funcionamiento normal del sistema nervioso central del insecto. LAMBDALAC, actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de la sinapsis y en los canales de sodio de las membranas, provocando parálisis y muerte al insecto. LAMBDALAC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas, para ello realizar la calibración del equipo. Usar corrector de pH, cuando el agua de preparación de la mezcla es igual o superior a pH 7.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA                  |                              | DOSIS     |           | PC<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|         | Nombre común           | Nombre científico            | (L/Ha)    | (L/Cil)   |              |              |
| MAIZ    | "Gusano cogollero"     | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.625     | 0.25      | 1            | 0.02         |
| PAPA    | "Gorgojo de los andes" | <i>Premnotypes vorax</i>     | 0.225-0.3 | 0.15-0.20 | 15           | 0.02         |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, 2 campañas por año para los cultivos de papa y maíz.

#### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

LAMBDALAC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina como el azufre y otros cúpricos. Se recomienda regar el campo de cultivo antes de la aplicación del producto.

#### FITOTOXICIDAD

LAMBDALAC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



**MODERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

