

30.0 cm

1.0 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Phosphonic acid.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- Si se produce el contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quítense inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con abundante agua, si la irritación persiste llamar al médico.
- Nota al médico: No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398 CROP BUSINESS SAC: 349-2669
ESSALUD: 0801-10 200 CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

GLUFONATE 200 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glufosinate ammonium 200 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 L

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GLUFONATE 200 SL (Glufosinato de amonio) es un herbicida de contacto, no selectivo. Puede ser aplicado mediante aplicación foliar dirigido al follaje de la maleza. Utilizado para el control de malezas anuales y perennes.

Realizar una premezcla y vaciar al tanque de preparación, previamente llenado a la mitad, luego completar con agua y remover hasta obtener una mezcla homogénea..

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>	1.0-1.5	28	0.1
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
	"Yuyo"	<i>Amaranthus spinosus</i>			
Mandarina	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	1.0-1.5	40	0.1
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límites máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar GLUFONATE 200 SL en post-emergencia de las malezas cuando se encuentren en etapa inicial de desarrollo.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GLUFONATE 200 SL es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: GLUFONATE 200 SL no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



2.2 cm