

35CM

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”  
 “MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenamiento de alimentos o agua para el consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: TRIAZINAS
  - En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
  - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
  - En caso de contacto con la piel, quite la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial necesario.
  - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:  
 CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)  
 ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200  
 GOLDER SAC: 998128710

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos o restos de aplicación.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de al menos 10 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# QUIOUT® 500SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRICOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

**COMPOSICIÓN**

Ametrina ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1870 - SENASA

Titular del Registro:  
**GOLDER SAC**  
 Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.  
 Formulador:  
 Kinyeld Industry Co. Limited

Importado por:

# GOLDER

Contenido Neto: 200 L  
 N° de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO                      NO INFLAMABLE                      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Adicionar **QUIOUT 500 SC**, según dosis recomendada en el equipo de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente lograr una mezcla homogénea.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Caña de azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	2-3	45	0.05
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Capuli cimarrón	<i>Nicandra physaloides</i>			
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar al detectar las primeras infestaciones, es decir, en post emergencia temprana de las malezas. Se recomienda realizar una aplicación / campaña / año.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- QUIOUT 500 SC** es compatible con la mayoría de herbicidas.

**FITOTOXICIDAD**

- No es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

20CM



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

