

COSAVET® DF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

COMPOSICIÓN:

Azufre.....800 g/Kg
Aditivos c.s.p...1 Kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148 – Piso 7
San Isidro, Lima 27 – Perú
Teléfono: (01) 630-6400,
Fax (01) 630-6410.

Formulado por:

SULPHUR MILLS LIMITED
604/605,349 Business Point
Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai, India.
Teléfono: +91-22-4345 2222
Fax: +91-22-43452245 / 2682 3716

**Importador
y distribuidor:**



Contenido neto: 1 Kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con los alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Conservar en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar ropa protectora durante la aplicación: guantes, botas, gafas y máscara. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorganic fungicide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No dar nada a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de Emergencia:** Infosalud: 0800-10-828, CISPROQUIM: 080-050-847.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas, no aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COSAVET® DF es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción contra oidiosis o mancha blanca en muchos cultivos. También tiene efecto acaricida contra ácaros fitopatógenos como el ácaro del tostado en los cítricos y el ácaro hialino que afecta a muchos cultivos.

Sistemas de Preparación y Aplicación

COSAVET® DF es una formulación de gránulos dispersables que no libera polvo, eliminando los riesgos de inhalación e irritación. Para preparar la mezcla llene el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue directamente la dosis indicada y complete con agua hasta llenar el tanque, manteniendo la mezcla en agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
- Aplicar de manera preventiva cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de plagas.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: COSAVET® DF es compatible con la mayoría de plaguicidas, pero por razones de fitotoxicidad debe evitarse mezclarse con aceites.

FITOTOXICIDAD: COSAVET® DF no es fitotóxico a las dosis recomendadas siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro, garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

Cultivo	ENFERMEDAD/PLAGA		DOSIS Kg/200 L de agua	P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre Científico			
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.75	5	N.A.
Melocotonero	Oidiosis	<i>Podospaera leucotricha</i>	0.5	5	N.A.
	Arañita bimaculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.5	5	N.A.
Algodonero	Oidiosis	<i>Erysiphe malachrae</i>	1.0	5	N.A.
Ají	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75	5	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	5	N.A.
<i>Capsicum annuum</i>	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0-2.0	5	N.A.
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	1.0	5	N.A.
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	1.0	5	N.A.

P.C.= Periodo de carencia en días.

L.M.R. = Límite máximo de residuos en partes por millón.

N.A.: No aplica.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
- CUIDADO -**

