0.5 cm 0.5 cm

18.0 cm

línea de semicorte (troquel)

0.5 cm

22.0 cm

3.3 cm

Cosavet® DF

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Azufre ..... 800 g/kg
Aditivos .....c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N°2302-SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:
SULPHUR MILLS LIMITED
604/605,349 Business Point
Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai, India.
Teléfono: +91-22-4345 2222
Fax: +91-22-43452245 / 2682 3716

Importado y distribuido por:

CONTENIDO NETO: 1 kg

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Lote Nº:
F. Form.:
F. Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.5 cm

0.5 cm 0.5 cm

18.0 cm

línea de semicorte (troquel)

0.5 cm

22.0 cm

3.3 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con los alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Conservar en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar ropa protectora durante la aplicación: guantes, botas, gafas y máscara. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Fungicida inorgánico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No dar nada a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya este envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas, no aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
COSAVET® DF es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción contra oidiosis o mancha blanca en muchos cultivos. También tiene efecto acaricida contra ácaros fitopatógenos como el ácaro del tostado en los cítricos y el ácaro hialino que afecta a muchos cultivos.
Sistemas de Preparación y Aplicación
COSAVET® DF es una formulación de gránulos dispersables que no libera polvo, eliminando los riesgos de inhalación e irritación. Para preparar la mezcla llene el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue directamente la dosis indicada y complete con agua hasta llenar el tanque, manteniendo la mezcla en agitación.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.
- Aplicar de manera preventiva cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de plagas.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: COSAVET® DF es compatible con la mayoría de plaguicidas, pero por razones de fitotoxicidad debe evitarse mezclarse con aceites.
FITOTOXICIDAD: COSAVET® DF no es fitotóxico a las dosis recomendadas siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro, garantiza que las características fisicoquímico del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD/PLAGA		DOSIS (kg/cil)	P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre científico			
Algodonero	Oidiosis	*Erysiphe malachrae*	1.0	5	N.A.
Ají	Ácaro hialino	*Polyphagotarsonemus latus*	0.75	5	N.A.
Arroz	Ácaro del vaneo	*Steneotarsonemus spinki*	1.0	35	N.A.
Capsicum annuum	Oidium	*Leveillula taurica*	1.0 - 2.0	5	N.A.
Mandarina	Ácaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	0.75	5	N.A.
Mango	Oidiosis	*Oidium mangíferae*	1.0	5	N.A.
Melocotonero	Oidiosis	*Podosphaera leucotricha*	0.5	5	N.A.
	Arañita bimaculada	*Tetranychus cinnabarinus*	0.5	5	N.A.
Palto	Ácaro	*Oligonychus punicae*	1.0	5	N.A.
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.5	5	N.A.

P.C.: Período de carencia en días. **L.M.R.:** Límite máximo de residuos en partes por millón. **N.A.:** No aplica.

0.5 cm