**18,0 ± 0,5**

**2,0 ± 0,5** | **2,0 ± 0,5**

**28,0 ± 0,5**

# AMIPRID 20 SP

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Polvo Soluble (SP)**

**Composición:**
Acetamiprid : 200 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1kg

**Registro PQUA N° 131-SENASA**

Silvestre Protección Vegetal

**Titular de Registro:**
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Formulado por:**
**VAPCO MANUFACTURING CO. LTD.**
Amman. Shmesani. Shaker Bin Zaid Street.
Jordania.

Contenido Neto: **1 kg**
Nº de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

VAPCO

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**4,2**

**Medidas en cms.**

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX: 328 7700**
**ESSALUD:411 8000 (opción 4)**
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, destruya el envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgantlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**AMIPRID® 20 SP** es un insecticida de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica, actuando por contacto e ingestión.
**AMIPRID® 20 SP** es empleado a través de aplicaciones foliares.
**AMIPRID® 20 SP** actúa como un análogo de acetilcolina, transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.
**AMIPRID® 20 SP** se aplica diluyéndolo con agua limpia a la dosis recomendada **en el cuadro de uso**. Aplicar en forma uniforme al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.
Se debe realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña.
En plantas de tomate, se recomienda la aplicación después de 3 meses de la siembra.

**PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al área tratada 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD**
**AMIPRID® 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común aplicado con aguas carbonatadas, los de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
**AMIPRID®20 SP** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | g/200 L | g/ha | | |
| **ALCACHOFA** | "Mosca minadora" | *Amauromyza maculosa* | 300 | - | 7 | 0.7 |
| **ARROZ** | "Sogata" | *Tagosodes orizicolus* | 100 | 100 | 14 | 0.01 |
| **CEBOLLA** | "Trips" | *Thrips tabaci* | 100 - 200 | 300 - 600 | 7 | 0.02 |
| **ESPÁRRAGO** | "Mosquilla de los brotes" | *Prodiplosis longifila* | 100 - 200 | 500 | 7 | 0.8 |
| **FRESA** | "Trips" | *Thrips tabaci* | 100 - 200 | - | 1 | 0.6 |
| **MANDARINA** | "Minador de la hoja de los cítricos" | *Phyllocnistis citrella* | 100 | 500 | 7 | 1 |
| **PALTO** | "Queresa del palto" | *Fiorinia fioriniae* | 100 | 500 | NA | 0.01 |
| **PIMIENTO** | "Mosca blanca"<br>"Mosquilla de los brotes" | *Bemisia tabaci*<br>*Prodiplosis longifila* | 100<br>200 | 200<br>500 | 7<br>7 | 0.2<br>0.3 |
| **TOMATE** | "Mosquilla de los brotes" | *Prodiplosis longifila* | 100 - 200 | 200 - 400 | 1 | 0.2 |
| **VID** | "Chinche harinoso" | *Pseudococcus viburni* | 100 | - | 7 | 0.5 |

**PC**: Período de Carencia (días). **NA:** No aplica **LMR**: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).

L AMIPRID
L SILVESTRE
L REZIO 75 WP
TEXTO
**P. Process black c**

L. VAPCO
**PANTONE 343 C**

L. VAPCO
**PANTONE 485 C**

L. AMIPRID
**PANTONE 377 C**

B. TOXICOLÓGICA
**P. YELLOW C**

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE**