


19,9 ± 0,5

	ETIQUETA	Revisión: 01 Aprobado: JR Fecha: 17-07-18 Página: 4 de 5
	YARDA 500 WP - NOVA CROP PROTECTION	



14,8 ± 0,5



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)

Composición:
Iprodione : 500 g/kg
Aditivos : c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA



Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg** (5 bolsas de 200 g)
F. de Form: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
N° Lote: 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
F. de Venc: Nanjing 211100 China.

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Dicarboximida: Iprodione.
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 - Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD:411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
- **YARDA® 500 WP** es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
 - **YARDA® 500 WP** actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
 - **YARDA® 500 WP** puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
- Se recomienda la aplicación de **YARDA® 500 WP** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
 - Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

- PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

- COMPATIBILIDAD**
YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

- FITOTOXICIDAD**
YARDA® 500 WP no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.


- RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"						
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	kg/ha		
AJO	"Podredumbre blanca"	Sclerotium cepivorum	400	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	Botrytis sp.	-	0.5	14	0.20
FRESA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	750	-	7	10
MANDARINA	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	200	0.50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	Botrytis cinerea	250	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris-moho gris"	Botrytis cinerea	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	300	-	14	0.01
TOMATE	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	200	-	7	0.5
VID	"Podrición gris"	Botrytis cinerea	-	1.00	5	0.45

PC: Periodo de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuo (ppm: partes por millón)

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Medidas en cm.

14,8 ± 0,5

14,8 ± 0,5

59,2

CAJA DE CARTÓN

L. YARDA



PANTONE 654 C

L. YARDA



PANTONE 877 C

L. SILVESTRE



PANTONE 364 C

B. TOXICOLÓGICA



PANTONE 293 C

TEXTO



P. Process Black

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE