

TEMIBLE® 48 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN

Glyphosate.....480 g/L
Aditivos (surfactante).....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2301 - SENASA



Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa, La Molina
Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
Jiangyin Dayo Chemicals Co Ltd.
No.18, Qingtong Road Qingyang,
Jiangying Jiangsu, China

Contenido Neto : 20 L
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosfonglicina
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
Teléfonos: CICOTOX: 328 7700; ESSALUD: 411 8000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua, en los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TEMIBLE 48 SL es un herbicida sistémico, no selectivo y post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para formar proteínas estructurales y metabolitos esenciales en el desarrollo de las malezas.
Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la cantidad del producto a aplicar y remover, luego completar con agua hasta su capacidad. Agitar y aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión sea manual, mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Naranja	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	2-3	30	0.5
	Yuyo	<i>Amaranthus sp</i>			
Caña de azúcar	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	2	30	2.0
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			
Café	Gramalote	<i>Urochloa mutica</i>	2	30	0.05
	Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>			

P.C.- Última aplicación antes de la cosecha en días
L.M.R.- Limite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la enfermedad.
Como máximo aplicar 2 veces por campaña/año. Con un intervalo mínimo de 14 días y previa evaluación.
En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismos de acción a fin de evitar resistencia.
Dosis máxima: 7.5 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO:

12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

