

28 +/- 0.5 cm

# TREBEN® 500 WP

# FUNGICIDA AGRÍCOLA

**COMPOSICIÓN:**

Reg. PQUA N° 2305 - SENASA

**Titular del Registro:**  
**NEOAGRUM S.A.C.**

Distribuido por:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Pj. Camino de Acceso N° 02 -  
Urb. Parcelación Cajamarquilla.  
Lurigancho - Lima - Perú.  
Teléfono: 617-3300**



**Contenido neto: 1 kg**

Nº de Lote: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD  
F. de Form.: No.1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo  
F. de Venc.: Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico si se ingiere o se inhala. Evite el contacto con la piel.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, etc.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Usar equipo protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
  - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
  - No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa mayor a 50%.
  - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - No utilizar ningún consejo que promueva el plaguicida debe utilizarse para conservar animal o agua para consumo.

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Benzimidazole**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328 7700  
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- No permitir el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
  - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
  - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TREBEN® 500 WP** es un fungicida preventivo y curativo de acción sistémica, efectivo contra un amplio rango de hongos que afectan diversos cultivos de campo. Puede usarse en pulverizaciones a toda la planta, también en pre y post cosecha o en tratamientos de inmersión de semilla de papa y desinfección de semillas. Llene hasta la mitad del recipiente con agua y agregue la dosis recomendada complete con agua agitando constantemente.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Como preventivo por impregnación de semilla antes de la siembra en aplicaciones foliares cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo del hongo. Como curativo ante la infección de las plantas por el hongo.

Realizar máximo 3 aplicaciones por campaña por año para aplicaciones foliares en el cultivo de zapallo con intervalos de aplicación de 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:**

**TREBEN® 500 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

**TREBEN® 500 WP** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGAS            |                               | DOSIS     |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común      | Nombre Científico             | g / 200 L | kg / ha   |                |                 |
| Espárrago | Chupadera fungosa | <i>Fusarium oxysporum</i>     | 200 - 300 | 0.4 - 0.6 | 1              | 0.1             |
| Vid       | Muerte Regresiva  | <i>Lasidopodia theobromae</i> | --        | 3.0       | 15             | 0.3             |
| Zapallo   | Oidium            | <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 200       | 0.4       | 7              | 2               |

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos

## TRATAMIENTO DE SEMILLAS

| CULTIVO | PLAGAS            |                           | DOSIS Y APLICACIÓN                                                              |
|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         | Nombre Común      | Nombre Científico         |                                                                                 |
| Algodón | Chupadera fungosa | <i>Rhizoctonia solani</i> | 3.5 - 4 g/kg o 165g/quintal de semilla                                          |
| Frijol  | Chupadera fungosa | <i>Rhizoctonia solani</i> | 3 - 4 g por kg de semilla *                                                     |
| Papa    | Rhizoctoniasis    | <i>Rhizoctonia solani</i> | 200 g/200 L. Sumergir por 3 minutos en la solución. Luego, tenerlo a la sombra. |

\* Mezclar en seco en forma uniforme de preferencia emplear tanque

