



30 x 15 cms

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE, BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- Causa daño temporal a los ojos.
- Causa irritación a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
Syngenta Perú: (1) 3484834
CISPROQUIM: 0800-50-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



REFLECT®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición

Isopirazam 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2306-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Formulado por:

Chemark Zrt.
Hungria

Importado y Distribuido por:

TQC TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C. N° 20307150981

Contenido Neto: 1 Litro

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- REFLECT® es un fungicida en concentrado emulsionable que actúa de manera preventiva o ante los primeros síntomas de la enfermedad
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de REFLECT® a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Añublo o pudrición de la vaina	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.5	30	0.01
	Podredumbre de la vaina	<i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i>	0.475		
	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5		
	Manchado de grano	<i>Sarocladium oryzae</i>	0.5		

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar REFLECT® (i.a. Isopirazam), una vez por campaña, dentro de un programa de manejo de enfermedades.
- Para obtener un control óptimo y económico, REFLECT® debe ser aplicado foliarmente en época de macollamiento medio del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar al área tratada hasta 24 horas, después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



6 pts

6 pts

6.5 pts