

	<b>ETIQUETA</b>
	<b>PROTURON 50 PM -ANHUI KOYO</b>

9,0 ± 0,5

POLVO MOJABLE (WP)  
HERBICIDA AGRÍCOLA  
**PROTURON**  
50 PM

# PROTURON<sup>®</sup>

## 50 PM

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
POLVO MOJABLE (WP)

**Composición**  
Linuron ..... 500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p 1kg

**REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA**

**Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por: NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.**  
N° 5-1215, Zhongtai Int'l Plaza,  
311 Mid Jiangdong Road, Nanjing. CHINA

**Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**

F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:



**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Úreas sustituidas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis. La acción preferente de **PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Elettaria indica</i>			
ALCACHOFA	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	400*	N.A.	0.05
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium amrosoides</i>			
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZÚCAR	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
ESPÁRAGO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	400*	1	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Elettaria indica</i>			
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora"	<i>Solanum nigrum</i>	250 - 500	14	0.2
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos  
\*Aplicar dosis de 600 g/200 litros de agua en altas infestaciones.  
PC: Periodo de Carencia.  
N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

Realizar una sola aplicación en pre emergencia y 1-2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación. Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azucar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** no es fitotóxico para los cultivos si se aplica en la forma y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

20,4 ± 0,5

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Medidas en cm.

14,0 ± 0,5

9,0 ± 0,5

46,0

CAJA DE CARTÓN

PROTURON  
L.SILVESTRE



PANTONE 363 C

PROBELTE



P. P. BLACK C

B. TOXICOLÓGICA



PANTONE 293 C

	ETIQUETA	
	PROTURON 50 PM - ANHUI KOYO	

23,0 ± 0,3

2,5 ± 0,2

# PROTURON<sup>®</sup>

## 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición :**

Linuron ..... 500 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA**

**Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por: NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.**  
 N° 5-1215, Zhongtai Int'l Plaza,  
 311 Mid Jiangdong Road, Nanjing. CHINA

**Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **20 kg**

F. de Form:  
 N° Lote:  
 F. de Venc:



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

30,0 ± 0,3

3,7

Medidas en cm.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Úreas sustituidas.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398  
 ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)  
 CISPROQUIM: 0800-50847

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis.

La acción preferente de **PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** no es fitotóxico para los cultivos si se aplica en la forma y dosis recomendadas.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga" "Pata de gallina"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ALCACHOFA	"Yuyo" "Hierba de gallinazo"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium ambrosioides</i>	400*	N.A.	0.05
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZUCAR	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	"Yuyo" "Chamico"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Datura stramonium</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ESPÁRRAGO	"Verdolaga" "Pata de gallina"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	400*	1	0.05
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora" "Verdolaga"	<i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	250 - 500	14	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos  
 \* Aplicar dosis de 600 g/ 200 litros de agua en altas infestaciones.

PC: Periodo de Carencia.  
 N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1 - 2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación. Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azúcar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.



BOLSA DE ALUMINIO TRILAMINADO

<p>PROTURON L.SILVESTRE</p>  <p>PANTONE 363 C</p>	<p>PROBELTE</p>  <p>P. P. BLACK C</p>	<p>B. TOXICOLÓGICA</p>  <p>PANTONE 293 C</p>
--	--	---

	<b>ETIQUETA</b>	
	<b>PROTURON 50 PM - ANHUI KOYO</b>	

23,0 ± 0,3

2,5 ± 0,2

# PROTURON<sup>®</sup>

## 50 PM

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición :**

Linuron ..... 500 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA**

**Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por: NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.**  
 N° 5-1215, Zhongtai Int'l Plaza,  
 311 Mid Jiangdong Road, Nanjing. CHINA

**Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **25 kg**

F. de Form:  
 N° Lote:  
 F. de Venc:



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

30,0 ± 0,3

3,7

Medidas en cm.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Úreas sustituidas.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398  
 ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)  
 CISPROQUIM: 0800-50847

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis.

La acción preferente de **PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**PROTURON<sup>®</sup> 50 PM** no es fitotóxico para los cultivos si se aplica en la forma y dosis recomendadas.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
ALCACHOFA	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	400*	N.A.	0.05
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZUCAR	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
ESPÁRRAGO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	400*	1	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora"	<i>Solanum nigrum</i>	250 - 500	14	0.2
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos  
 \* Aplicar dosis de 600 g/ 200 litros de agua en altas infestaciones.

PC: Periodo de Carencia.  
 N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1 - 2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación

Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azucar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.



BOLSA DE ALUMINIO TRILAMINADO

<p>PROTURON L.SILVESTRE</p>  <p>PANTONE 363 C</p>	<p>PROBELTE</p>  <p>P. P. BLACK C</p>	<p>B. TOXICOLÓGICA</p>  <p>PANTONE 293 C</p>
--	--	---



6,4 ± 0,1

POLVO MOJABLE ( WP )  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
**50 PM**  
**PROTURON**

19,1 ± 0,1

**PROTURON**<sup>®</sup>  
**50 PM**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
**POLVO MOJABLE ( WP )**

**Composición:**  
 Linuron ..... 500 g/kg  
 Aditivos.....c.s.p 1 kg

**REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA**

**Titular del Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
 Tel.: (01) 617-3300  
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por:** NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.  
 N° 5-1215, Zhongtai Int'l Plaza,  
 311 Mid Jiangdong Road, Nanjing, CHINA

**Importado y Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **500 g**  
 F. de Form:  
 N° Lote:  
 F. de Venc:



**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
  - Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
  - Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
  - Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
  - No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajeras y/o semillas.
  - Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
  - Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
  - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**  
 Grupo Químico: Ureas sustituidas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398**  
**ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**PROTURON® 50 PM** es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis. La acción preferente de **PROTURON® 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

**PROTURON® 50 PM** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado. **CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
ALCACHOFA	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	400*	N.A.	0.05
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZÚCAR	"Cudillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			
CEBOLLA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ESPÁRRAGO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	400*	1	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. olerifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora"	<i>Solanum nigrum</i>	250 - 500	14	0.2
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos  
 \* Aplicar dosis de 600 g/200 litros de agua en altas infestaciones.  
 PC: Período de Carenacia  
 N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
 Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1 - 2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación.  
 Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azúcar y Cebolla la aplicación se realiza de la siembra o del transplante del cultivo

**PERIODO DE REINGRESO**  
 Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto

**COMPATIBILIDAD**  
**PROTURON 50 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
**PROTURON 50 PM** no es fitotóxico para los cultivos si se aplica en la forma y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
 El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas


**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
 - Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



PROTURON L.SILVESTRE    PROBELTE    B. TOXICOLÓGICA  
 PANTONE 363 C    P. P. BLACK C    PANTONE 293 C



**10,0 ± 0,3**

**PROTURON<sup>®</sup>**  
**50 PM**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**  
Linuron ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p 1kg

**REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA**

**Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por: NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.**  
N° 5-1215, Zhongtai Int'l Plaza,  
311 Mid Jiangdong Road, Nanjing, CHINA

**Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **100 g**  
F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

**13,0 ± 0,3**

**1,6**

Medidas en cm.

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el empaque, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas frescas y semillas.
- Transportar el producto protegido en un empaque adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
Grupo Químico: Inertes sustituidas.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTEX: 0-800-1-2688 a 328 7398  
ESSALUD: 0881-10200 ó 411 8000 (opción 4)  
CERPOQUE: 0800-0844

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**PROTURON 50 PM** es un herbicida selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis.  
La acción preferente de **PROTURON 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

**PROTURON 50 PM** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/ha)		PC (días)	LMR (g/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Suelo ligero	Suelo pesado		
ARZO	"Verdeajo"	Portulaca oleracea	250 - 375		N.A.	0,05
ALCACHOFA	"Pala de gallina"	Echinochloa indica	400*		N.A.	0,05
ARROZ	"Hierba de gallinazo"	Amaranthus dubius Chenopodium ambrosioides	125 - 250	45	0,1	
CAÑA DE AZÚCAR	"Cardillo"	Cenchrus echinatus	125 - 250		N.A.	0,05
CEBOLLA	"Yuyo"	Amaranthus dubius Digitaria atriplicifolia	250 - 375		N.A.	0,05
ESPÁRRAGO	"Verdeajo"	Portulaca oleracea	400*		1	0,05
PAPA	"Mostaza"	Brassica rapa esp. oleifera	375 - 625		80	0,05
ZANAHORIA	"Hierba Mala"	Solanum nigrum Portulaca oleracea	250 - 500		14	0,2

LMR: Límite Máximo de Residuos  
\*Aplicar dosis de 400 g/200 litros de agua en altas infestaciones.  
PC: Periodo de Carencia  
N.A.: No aplica

**BOLSA DE ALUMINIO TRILAMINADO**

PROTURON L.SILVESTRE ■ PANTONE 363 C

PROBELTE ■ P. P. BLACK C

B. TOXICOLÓGICA ■ PANTONE 293 C