

	ETIQUETA	
	PROTURON 50 PM - ANHUI KOYO	

23,0 ± 0,3

2,5 ± 0,2

PROTURON[®]

50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición :

Linuron 500 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA

Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD
 Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo. Zhejiang
 Province. China

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **20 kg**

F. de Form:
 N° Lote:
 F. de Venc:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

30,0 ± 0,3

3,7

Medidas en cm.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Úreas sustituidas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada.
 - Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
 ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
 CISPROQUIM: 0800-50847

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROTURON[®] 50 PM es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis.

La acción preferente de **PROTURON[®] 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga" "Pata de gallina"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ALCACHOFA	"Yuyo" "Hierba de gallinazo"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium ambrosioides</i>	400*	N.A.	0.05
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZUCAR	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	"Yuyo" "Chamico"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Datura stramonium</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ESPÁRRAGO	"Verdolaga" "Pata de gallina"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	400*	1	0.05
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora" "Verdolaga"	<i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	250 - 500	14	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos

* Aplicar dosis de 600 g/ 200 litros de agua en altas infestaciones.

PC: Periodo de Carencia.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1 - 2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación. Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azucar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.



BOLSA DE ALUMINIO TRILAMINADO

PROTURON
L.SILVESTRE



PANTONE 363 C

PROBELTE



P. P. BLACK C

B. TOXICOLÓGICA



PANTONE 293 C

	ETIQUETA	
	PROTURON 50 PM - ANHUI KOYO	

23,0 ± 0,3

2,5 ± 0,2

PROTURON[®]

50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición :

Linuron 500 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA

Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD
 Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo. Zhejiang
 Province. China

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **25 kg**

F. de Form:
 N° Lote:
 F. de Venc:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

30,0 ± 0,3

3,7

Medidas en cm.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Úreas sustituidas.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
 ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
 CISPROQUIM: 0800-50847

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROTURON[®] 50 PM es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis.

La acción preferente de **PROTURON[®] 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

PROTURON[®] 50 PM se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

PROTURON[®] 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PROTURON[®] 50 PM no es fitotóxico para los cultivos si se aplica en la forma y dosis recomendadas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga" "Pata de gallina"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ALCACHOFA	"Yuyo" "Hierba de gallinazo"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Chenopodium ambrosioides</i>	400*	N.A.	0.05
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZUCAR	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
CEBOLLA	"Yuyo" "Chamico"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Datura stramonium</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ESPÁRRAGO	"Verdolaga" "Pata de gallina"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i>	400*	1	0.05
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. oleifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora" "Verdolaga"	<i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	250 - 500	14	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos
 * Aplicar dosis de 600 g/ 200 litros de agua en altas infestaciones.

PC: Periodo de Carencia.
 N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1 - 2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación

Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azucar y Cebolla la aplicación se realiza antes de la siembra o del trasplante del cultivo.



BOLSA DE ALUMINIO TRILAMINADO

PROTURON
L.SILVESTRE



PANTONE 363 C

PROBELTE



P. P. BLACK C

B. TOXICOLÓGICA



PANTONE 293 C



6,4 ± 0,1

POLVO MOJABLE (WP)
HERBICIDA AGRÍCOLA
50 PM
PROTURON

19,1 ± 0,1

PROTURON[®]
50 PM
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Linuron 500 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA

Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang
Province, China.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **500 g**

F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajeras y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ureas sustituidas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROTURON[®] 50 PM es un herbicida sistémico selectivo a base de linuron, que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis. La acción preferente de **PROTURON[®] 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

PROTURON[®] 50 PM se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200L Suelo ligero - Suelo pesado	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
AJO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	250 - 375	N.A.	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
ALCACHOFA	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	400*	N.A.	0.05
	"Hierba de gallinazo"	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
APIO	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physaloides</i>	125 - 250	45	0.1
CAÑA DE AZÚCAR	"Cudillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	125 - 250	N.A.	0.05
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			
CEBOLLA	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	250 - 375	N.A.	0.05
ESPÁRRAGO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	400*	1	0.05
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
PAPA	"Mostaza"	<i>Brassica rapa ssp. olerifera</i>	375 - 625	90	0.05
ZANAHORIA	"Hierba Mora"	<i>Solanum nigrum</i>	250 - 500	14	0.2
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos
* Aplicar dosis de 600 g/200 litros de agua en altas infestaciones.
PC: Período de Carenacia
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación en pre-emergencia y 1 - 2 aplicaciones en post-emergencia temprana, previa evaluación. Para los cultivos Ajo, Alcachofa, Caña de azúcar y Cebolla la aplicación se realiza de la siembra o del transplante del cultivo

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD

PROTURON 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con herbicidas de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

PROTURON 50 PM no es fitotóxico para los cultivos si se aplica en la forma y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Medidas en cm.

12,9 ± 0,1

6,4 ± 0,1

38,6

CAJA DE CARTÓN

PROTURON
L. SILVESTRE



PANTONE 363 C

PROBELTE



P. P. BLACK C

B. TOXICOLÓGICA



PANTONE 293 C



10,0 ± 0,3

PROTURON[®]
50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Linuron 500 g/kg
Aditivos c.s.p 1kg

REGISTRO N° 627 - 98 - AG - SENASA

Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.LTD
Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **100 g**
F. de Form:
N° Lote:
F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

1,6

Medidas en cm.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el empaque, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas frescas y semillas.
- Transportar el producto protegido en un empaque adecuado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Inertes sustituidas.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTEX: 0-800-1-3688 a 328 7398
ESSALUD: 081-1020 o 411 8000 (opción 4)
CERPOQUE: 0800-0844

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PROTURON 50 PM es un herbicida selectivo de acción sistémica que actúa interfiriendo el metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis. La acción preferente de **PROTURON 50 PM** es a través de las raíces como un herbicida residual, pero también se puede usar sobre malezas emergidas en estado joven y crecimiento activo.

PROTURON 50 PM se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar empleando cualquier equipo terrestre de pulverización a palanca o motor que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/ha)		PC (días)	LMR (g/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Suelo ligero	Suelo pesado		
ADIZO	"Verdeaga"	Portulaca oleracea	250 - 375		N.A.	0,05
ALCACHOFA	"Pala de gallina"	Echinochloa indica			N.A.	0,05
ARROZ	"Hierba de gallinazo"	Amaranthus dubius Chenopodium ambrinosioides	400*		N.A.	0,05
CAÑA DE AZÚCAR	"Cachillo"	Cenchrus echinatus	125 - 250		N.A.	0,05
CEBOLLA	"Yuyo"	Amaranthus dubius Digitaria atriplicata	250 - 375		N.A.	0,05
ESPÁRRAGO	"Verdeaga"	Portulaca oleracea	400*		1	0,05
PAPA	"Mostaza"	Brassica rapa esp. oleifera	375 - 625		80	0,05
ZANAHORIA	"Hierba Mala"	Solanum nigrum Portulaca oleracea	250 - 500		14	0,2

LMR: Límite Máximo de Residuos
*Aplicar dosis de 400 g/200 litros de agua en altas infestaciones.
PC: Periodo de Carencia
N.A.: No aplica

BOLSA DE ALUMINIO TRILAMINADO

PROTURON
L.SILVESTRE

PANTONE 363 C

PROBELTE

P. P. BLACK C

B. TOXICOLÓGICA

PANTONE 293 C