

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS USOS Y APLICACIÓN**

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante a los ojos. Causa daño o irritación de la córnea. Puede causar daño temporal a los ojos, si no se usa el equipo de protección ocular.
- Causa irritación moderada a la piel. Evitar el contacto con la piel y ropa.
- Presenta propiedades de sensibilización a la piel, por lo que puede causar alergias, debe usarse equipo de protección ocular y dermal.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No desatorar las boquillas con la boca.
- Guardar el producto en lugar seguro, bajo sombra y con llave, en su envase original, bien cerrado, lejos del alcance de los niños y animales.
- No aplicar en dirección contraria al viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazinonas.
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, provocar el vómito solo por indicación del médico, para esto debe suministrarse agua o sal.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 117.**
- NOTA AL MÉDICO: No hay antídoto. Tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# METRIBEC 48 SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### HERBICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición:**

Metribuzin..... 480 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

### Reg. PQUA N° 397 - SENASA

**Titular del registro: HORTUS S.A.**

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

**Formulado por:**

**TRUSTCHEM Co. Ltd.**  
23 rd Floor Golden Eagle  
International Plaza, 89 Hanzhong Rd.,  
Nanjing, 210029,  
CHINA.

**Importado y distribuido por:**

**hortus**  
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Telf: 717-9040 / 717-9041  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido Neto: 200 L**

Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Es un herbicida que pertenece al grupo de triazinonas y actúa selectivamente contra las malezas anuales de hoja ancha y angosta. **METRIBEC 48 SC**, posee acción de contacto pudiendo ser aplicado en pre y post-emergencia y pretransplante al cultivo. Es absorbido por las malezas y translocado al resto de la planta.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO        | M A L E Z A S                                                                                                                                                                             |                              | D O S I S  |               | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                | Nombre común                                                                                                                                                                              | Nombre científico            | L/Ha       | L/cil<br>200L |              |              |
| Zanahoria      | Yuyo                                                                                                                                                                                      | <i>Amaranthus spp.</i>       | 0.4        | 0.2           | 60           | 0.1          |
|                | Amor seco                                                                                                                                                                                 | <i>Bidens pilosa</i>         |            |               |              |              |
| Papa           | Pata de gallina                                                                                                                                                                           | <i>Eleusine indica</i>       | 60         | 0.6           | 60           | 0.6          |
|                | Chamico                                                                                                                                                                                   | <i>Datura stramonium</i>     |            |               |              |              |
|                | Rabo de zorro                                                                                                                                                                             | <i>Setaria verticillata</i>  |            |               |              |              |
|                | Yuyo                                                                                                                                                                                      | <i>Amaranthus spp.</i>       |            |               |              |              |
| Tomate         | Tratamiento de pre-emergencia, antes de la emergencia del cultivo y de la maleza. Tratamiento de post-emergencia, aplicar antes que la maleza tenga 2.5 cm y con un brote de 5 cm máximo. |                              | 0.6 - 1.40 | 7             | 0.1          | 0.1          |
|                | Leptochloa                                                                                                                                                                                | <i>Leptochloa uninervia</i>  |            |               |              |              |
|                | Hierba del gallinazo                                                                                                                                                                      | <i>Chenopodium spp.</i>      |            |               |              |              |
| Espárrago      | Yuyo                                                                                                                                                                                      | <i>Amaranthus viridis</i>    | 14         | 0.1           | 14           | 0.1          |
|                | Gramma China                                                                                                                                                                              | <i>Sorghum halepense</i>     |            |               |              |              |
|                | Verdolaga                                                                                                                                                                                 | <i>Portulaca oleracea</i>    |            |               |              |              |
| Palto          | Control pre-emergente y post-emergente de malezas de hoja ancha y gramíneas.                                                                                                              |                              | 0.25       | 14            | 0.1          | 0.1          |
| Caña de azúcar | Pata de gallina                                                                                                                                                                           | <i>Eleusine indica</i>       | 3          | -             | 60           | 0.1          |
|                | Cola de zorro                                                                                                                                                                             | <i>Leptochloa filiformis</i> |            |               |              |              |
|                | Paico                                                                                                                                                                                     | <i>Chenopodium album</i>     |            |               |              |              |
|                | Verdolaga                                                                                                                                                                                 | <i>Portulaca oleracea</i>    |            |               |              |              |

PC: Período de Carencia en días LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm. ND: No Definido

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar en pre-emergencia del cultivo después de la siembra o en la post-emergencia o transplante del cultivo en forma selectiva, dirigiendo la aspersión solo al follaje de la maleza presente. En zanahoria, papa, tomate y Palto se aplica una vez por campaña / año; en espárrago 2 aplicaciones / año, 1 por campaña. Mejores resultados se obtienen con aplicaciones en suelo húmedo.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 12 horas para reingresar al área tratada.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina fuerte o ácida.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

