

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DE
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa, así como aspirar. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

PRIMEROS AUXILIOS
Teléfonos de emergencia:
ESSALUD: 411 8000 anexo 4
Infosalud: 0800-10-828
CICOTOX: 0800-13040



Contenido neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

v20180921

METRIBEC 48 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Metribuzin..... 480 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 397 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

Formulado por:
TRUSCHEM Co. Ltd.
23 rd Floor Golden Eagle
International Plaza, 89 Hanzhong Rd.,
Nanjing, 210029,
CHINA.

Importado y distribuido por:
hortus.
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un herbicida que pertenece al grupo de triazolinonas y actúa selectivamente contra las malezas anuales de hoja ancha y angosta. **METRIBEC 48 SC**, posee acción de contacto pudiendo ser aplicado en pre y post-emergencia y pretransplante al cultivo. Es absorbido por las malezas y translocado al resto de la planta.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/cil 200L		
Zanahoria	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	0.4	0.2	60	0.1
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	Suelos livianos		60	0.6
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>	0.5 - 0.75			
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>	Suelos pesados			
	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	1.0 - 1.5			
Tratamiento de pre-emergencia, antes de la emergencia del cultivo y de la maleza. Tratamiento de post-emergencia, aplicar antes que la maleza tenga 2.5 cm y con un brote de 5 cm máximo.						
Tomate	Leptochloa	<i>Leptochloa uniervia</i>	0.6 - 1.40		7	0.1
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>				
En campos transplantados: aplicar 10 a 15 días después del trasplante. No aplicar otro herbicida antes de 24 horas de aplicado el METRIBEC 48 SC. En siembra directa aplicar en pre-emergencia inmediatamente después de la siembra.						
Espárrago	Yuyo	<i>Amaranthus viridis</i>	0.3 - 0.5 (post emergente)		14	0.1
	Gramma China	<i>Sorghum halepense</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
Pailo	Control pre-emergente y post-emergente de malezas de hoja ancha y gramíneas.		0.25		14	0.1
Caña de azúcar	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	3	-	60	0.1
	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>				
	Paico	<i>Chenopodium album</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Periodo de Carencia en días LMR: Limite Máximo de Residuos en ppm. ND: No Definido

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

