

RASPADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Nicosulfuron..... 750 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° ... - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
ANHUI JUKAI AGROCHEMICAL CO., LTD.
Room 105, N° 88 Anju Garden, Qinyang
Road, Hefei city, Anhui Province, P.R. China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 g

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo si se ingiere.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Pyrimidinylsulfonilurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén bien levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0800-13040, ESSALUD Telf.: 0801-10200, DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 501-1000
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS Kg/ha	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.04 - 0.05	45	0.01
	Arrocillo	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>			
	Gramma	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

RASPADOR, es un herbicida sistémico y selectivo, controla malezas gramíneas anuales y perennes y malezas de hoja ancha cuando es aplicado como postemergente.

RASPADOR actúa por absorción foliar, no debe aplicarse después de que las malezas hayan emergido. No se debe aplicar en plantas de maíz que tengan mas de 50 cm de altura. Las malezas deben tratarse tempranamente antes de competir con el cultivo.

Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad de agua; adicione el producto. Complete con agua el volumen. Agite hasta que la mezcla sea homogénea.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

RASPADOR, se aplica en post emergencia, cuando el cultivo está en estadio de 2 a 6 hojas, después de la emergencia de las malezas. La aplicación debe dirigirse entre las filas cuando sea posible. Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña y hasta 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RASPADOR, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes fuertes o bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

