



LIGERAMENTE PELIGROSO

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

"MÁNTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS

Método de aplicación: **BOING** se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre como bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de aplicado el producto.

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas"

ENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.
Cajamarquilla 1ra etapa, Parcela 62, Lt. B y Sub lote
Parcela 64, Lt.B. Lurigancho - Chosica - Lima

Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9
Magdalena del Mar Lima - Perú.
Teléfono: 501-1000

Capacidad	100 ml 250 ml 500 ml 1 ltr 5 litros 10 litros 20 litros 200 litros
Material	Frascos, galoneras, bidones de polietileno de alta densidad (PEAD), Cilindros plásticos y metálicos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico:	Líquido
- Color:	Verde claro
- Olor:	Sin olor

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

BOING®


FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

NOMBRE COMÚN (ISO):
Kasugamycin 20 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
(5-amino-2-methyl-6-(2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyloxy)tetrahydropyran-3-yl)amino- α -iminoacetic acid

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA MOLECULAR Y EMPÍRICA:
C₁₄H₂₆N₈O₈, 391.38



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases:
Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



Cultivo	Enfermedad		Dosis L/ha	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Ajo	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1.5 - 2.0	30	0.01

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda realizar dos aplicaciones de **BOING** por campaña y dos campañas por año. Rotar con productos de diferente modo de acción entre aplicaciones.

Mecanismo de acción: **BOING** inhibe la incorporación de aminoácidos a la síntesis de proteínas en hongos y bacterias.

Modo de acción: **BOING** es un fungicida sistémico a base Kasugamycin con acción curativa y protectante. **BOING** es rápidamente absorbido por las hojas y raíces y translocado rápidamente a todas las partes de la planta donde previene el establecimiento de la infección del patógeno.

Compatibilidad: **BOING** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.



COD.