

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles (Myclobutanil).

Grupo químico: Phenoxyquinolina (Quinoxifen).

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta. En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de EMERGENCIA, llamar al 0800-13-040 CICOTOX ó al 0800-50-847 CISPROQUIM ó al 411-8000 Aló EsSalud.
BASF Peruana S.A.: (01) 513 2500.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Arius™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Myclobutanil45 g/L

Quinoxifen45 g/L

Aditivoc.s.p. 1 L

Registro PQUA No. 2323-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

BASF Peruana S.A.

Av. O.R. Benavides 5915 - Callao

Casilla 3911, Lima 100

Tel: (01) 513 2500, Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences Limited

Estuary Road

King's Lynn

Norfolk PE30 2JD

Inglatera

BASF

We create chemistry

CONTENIDO NETO: 1 L

LOTE No.:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

© ™ Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Arius™, es un fungicida sistémico translaminar de acción curativa y preventiva, controla enfermedades como la oidiosis en el cultivo de vid. La preparación de la mezcla se realiza llenando el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Arius™** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Arius™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS L / ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	1.0	14	1 ^(a) 1 ^(b)

*P.C.: Período de carencia en días.

**L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm. (a) Myclobutanil, (b) Quinoxifen.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar 1 aplicación de **Arius™** por campaña, considerando 1 campaña al año. Aplicar en infecciones iniciales con 3 - 5% de infección, es decir a la vista de los primeros síntomas.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO