

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- #### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Triazoles (Myclobutanil).**
Grupo químico: Phenoxyquinolina (quinoxifen).
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta. En caso de ingestión, no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: Este producto no existe antídoto específico. El tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA.,
SUCURSAL PERU: 444-3096

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Arius™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICION:

Myclobutanil45 g/L
Quinoxifen45 g/L
Aditivos c.s.p.: 1 L

Reg. PQUA N° 2323-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SummitAgro

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU
Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro. Lima Perú
Telf: (511) 444-3096

Formulado por
DOW AGROSCIENCES LIMITED

Estuary Road
King's Lynn
Norfolk PE30 2JD
Inglaterra

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

®™ Marca de the Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía de Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Arius™, es un fungicida sistémico translaminar de acción curativa y preventiva que controla eficazmente enfermedades como Oidiosis en el cultivo de vid. Está formulado a base de Myclobutanil que actúa inhibiendo la biosíntesis de esterol y de Quinoxifen que impide el ingreso del patógeno interfiriendo en las señales iniciales de la infección.

La preparación de la mezcla se realiza llenando el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Arius™** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Arius™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	1.0	14	1 ^(a) 1 ^(b)

*PC: Período de Carencia

**LMR: Límite máximo de residuos en ppm. (a) Myclobutanil, (b) Quinoxifen.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar 1 aplicación de **Arius™** por campaña, considerando 1 campaña al año. Aplicar en infecciones iniciales con 3 - 5% de infección, es decir a la vista de los primeros síntomas.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

