

Atranex

50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Atrazine 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 288-96-AG - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262. Ahsdod. 77102. Israel.

Contenido neto: **5 Litros**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA NTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
 - No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
 - Utilizar ropa protectora, guantes botas y máscara durante el manipuleo y aplicación.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo químico:** Triazinas
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 - **Nota al médico:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX : 0800- 1-3040

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para animales domésticos.
 - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Atranex 50 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana. Agite el envase antes de abrir. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano. Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego .

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	1.5 - 2.5	N.A	0.20
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pichana	<i>Sida acuta</i>			
	Cerraja	<i>Cenchrus oleraceus</i>			
	Capullí cimarrón	<i>Nicanandra physalodes</i>			
	Mata gusano	<i>Flaveria bidentis</i>			
MAIZ	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	1.5 - 2.5	60	0.20 (grano) 1.5 (forraje)
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pichana	<i>Sida acuta</i>			
	Cerraja	<i>Cenchrus oleraceus</i>			
	Capullí cimarrón	<i>Nicanandra physalodes</i>			
	Mata gusano	<i>Flaveria bidentis</i>			

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña. Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4 hojas) de las malezas. No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya cerrado.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver la Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta necesita Hoja Informativa