

Atranex

50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Atrazine 500 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 288-96-AG - SENASA


Titular del Registro,
 Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
 Av. El Derby N° 254, Of. N° 306,
 Santiago de Surco. Lima - Perú.
 Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
 Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
 Barranquilla, Colombia.

Contenido neto: **5 Litros**
 Lote No.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



ADAMA

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA NTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- **Nota al médico:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD en línea (01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Atranex 50 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post-emergencia temprana. Agite el envase antes de abrir. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano. Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo	<i>Amaranthus</i> spp.	1.5 - 2.5	N.A.	0.20
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium</i> spp.			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia</i> spp.			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Rabo de zorra	<i>Setaria</i> spp.			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pichana	<i>Sida acuta</i>			
	Cerraja	<i>Cenchrus oleraceus</i>			
MAIZ	Yuyo	<i>Amaranthus</i> spp.	1.5 - 2.5	60	0.20 (grano) 1.5 (forraje)
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium</i> spp.			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia</i> spp.			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Rabo de zorra	<i>Setaria</i> spp.			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Pichana	<i>Sida acuta</i>			
	Cerraja	<i>Cenchrus oleraceus</i>			
Capullí cimarrón	<i>Nicanandra physalodes</i>				
Mata gusano	<i>Flaveria bidentis</i>				

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña. Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4 hojas) de las malezas. No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya cerrado.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver la Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

Esta etiqueta necesita Hoja Informativa