

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Req. N° 288-96-AG - SENASA

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262.
Ashdod 771021, Israel

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes botas y máscara durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- **Nota al médico:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD en línea(01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)664-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Atrazen 50 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana.

Agite el envase antes de abrir. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano.

Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO						
CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)	
	Nombre común	Nombre científico				
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	1.5 - 2.5	N.A	0.20	
	Hierba gallinazo	<i>Cenchrus ciliaris</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Pata de gallina	<i>Euphorbia indica</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pichana	<i>Sida acuta</i>				
	Cerajá	<i>Cenchrus ciliaris</i>				
Capulí cimarrón	<i>Nicotiana glauca</i>					
Mato gusano	<i>Flaveria bidentis</i>					
MAÍZ	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	1.5 - 2.5	60	0.20 (gran)	
	Hierba gallinazo	<i>Cenchrus ciliaris</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Pata de gallina	<i>Euphorbia indica</i>				
	Lechera	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pichana	<i>Sida acuta</i>				
	Cerajá	<i>Cenchrus ciliaris</i>				
Capulí cimarrón	<i>Nicotiana glauca</i>				1.5 (forra)	

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña.
Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4
hojas) de las malezas.
No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya
cerrado.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver la Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta necesita Hoja Informativa

Atranex

50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Atrazine500 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 288-96-AG - SENASA

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306,
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262.
Ashdod 771021, Israel

Contenido neto: **5 Litros**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes botas y máscara durante el manipuleo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Nota al médico:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD en línea(01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

ECONOMÍA TRIPLE LAVADO SEGURIDAD AMBIENTE

DIVISION GENERAL DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS AGROPECuarios SENASA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Atranex 50 SC es un herbicida selectivo del grupo de las triazinas utilizado para el control de un amplio rango de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana. Agite el envase antes de abrir. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 litros por hectárea y boquillas de abanico plano. Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto se necesita la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)			
	Nombre común	Nombre científico						
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo	Amaranthus spp.	1.5 - 2.5	N.A	0.20			
	Hierba gallinaza	Chenopodium spp.						
	Amor seco	Bidens pilosa						
	Pata de gallina	Eleusine indica						
	Lechera	Euphorbia spp.						
	Verdolaga	Portulaca oleracea						
	Rabo de zorro	Setaria spp.						
	Chamico	Datura stramonium						
	Pichana	Sida acuta						
	Cerraja	Cenchrus oleaceus						
	Capuli cimarron	Nicotiana glauca						
	Mata usano	Faviera bidentis						
	Yuyo	Amaranthus spp.				1.5 - 2.5	60	0.20 (grano) 1.5 (forraje)
	Hierba gallinaza	Chenopodium spp.						
Amor seco	Bidens pilosa							
Pata de gallina	Eleusine indica							
Lechera	Euphorbia spp.							
Verdolaga	Portulaca oleracea							
Rabo de zorro	Setaria spp.							
Chamico	Datura stramonium							
Pichana	Sida acuta							
Cerraja	Cenchrus oleaceus							
Capuli cimarron	Nicotiana glauca							
Mata usano	Faviera bidentis							

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña. Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4 hojas) de las malezas. No aplicar en el cultivo de caña de azúcar una vez que el campo haya cerrado.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver la Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.