

# Ametrex®

## 50 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**HERBICIDA AGRÍCOLA**  
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:  
 Ametryn ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 289-96-AG - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. El Derby N° 254 Of 503.  
 Santiago de Surco. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Agan Ltd.**  
 Northern Industrial Zone.  
 P.O. Box 262. Ahsdod 77102. Israel.

Contenido neto: **5 Litros**  
 Lote No.  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



### LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación lleve a la víctima al aire libre, brindar respiración artificial si es necesario. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fue con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
 CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX: 0800-13040

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame absorber el producto con arena u otro material inerte y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Ametrex 50 SC** es utilizado para el control de malezas anuales de hoja ancha y gramíneas en pre y post emergencia temprana. Si bien, **Ametrex 50 SC** es un herbicida selectivo se debe evitar el contacto con el cultivo y dirigir la aspersión hacia la zona de crecimiento de las malezas. Agitar el envase antes de abrir. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto mantener en marcha el sistema de agitación. La dosis exacta de aplicación dependerá del tipo de suelo, cultivo, especies de malezas a controlar y duración efectiva del periodo de control deseado. Para obtener una actividad herbicida completa y facilitar la absorción del producto por las raíces es necesaria la presencia de humedad en el suelo, por lo que se debe aplicar durante la estación de lluvias o antes del riego. En ausencia de humedad, incorporar el plaguicida en los primeros 2.5 - 5.0 cm de suelo.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
CAÑA DE AZÚCAR	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>	3.0 - 4.0	30	0.25
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>			
MANDARINA	Moco de pavo	<i>Echinochloa spp.</i>	2.5 - 4.0	30	0.25
	Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>			
	Hierba gallinazo	<i>Chenopodium spp.</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia spp.</i>			
	Rabo de zorro	<i>Setaria spp.</i>			

P.C.: Periodo de Carencia LMR: Limite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

N° máximo de aplicaciones por campaña: 2  
 Aplicar a la pre-emergencia y/o post-emergencia temprana (2 - 4 hojas) de la malezas.

No aplicar una vez que el campo se ha cerrado (caña de azúcar).

#### PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada, sin ropa de protección, después de 12 horas de haber aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

No es compatible con compuestos de marcada reacción ácida o alcalina. **Ametrex 50 SC** puede ser aplicado en mezcla con otros herbicidas.

#### FITOTOXICIDAD

Evitar la deriva del producto durante la aplicación, debido a que **Ametrex 50 SC** puede dañar los cultivos vecinos. Debido a la actividad residual del producto en el suelo, no sembrar en rotación con cultivos sensibles durante un año después de la aplicación.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm