

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- 0Este producto es dañino, no ingerir.
- 0Causa irritación moderada a los ojos.
- 0Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- 0Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- 0No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- 0No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- 0Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- 0Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- 0Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- 0Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Organophosphate**

- 0En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- 0En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- 0En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- 0En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- 0En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- 0ANTÍDOTO: Sulfato de Atropina: vía endovenosa o intramuscular.
- 0Antes de administrar Atropina debe procurarse una oxigenación adecuada para reducir el riesgo de arritmias cardíacas.
- 0La dosis inicial recomendada de Atropina varía de 1 a 4 mg en adultos, y 0.02 mg/kg en niños, por vía intravenosa.
- 0Cada cinco minutos debe verificarse si aparecen signos de atropinización (midriasis, sequedad de la piel y mucosas) objetivo de la terapia. En caso que no se observen estos, la dosis debe duplicarse, cada cinco minutos, hasta la atropinización.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

- 0CICOTOX: 0800-13040.
- 0CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- 0Después de usar el contenido, enjuaguese tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- 0Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- 0Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- 0Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- 0Peligroso para organismos acuáticos.
- 0No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- 0No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- 0Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- 0Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- 0El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- 0El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- 0En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

# EXTINTHOR

## 50 EC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Profenofos ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 2324 - SENASA

**Titular de Registro:**

**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.  
Teléfono: + 51 -1 - 222-2795



**Formulado por:**

**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

**Importado y Distribuido por:**

**SANIVEG PERU S.A.C.**  
Prolongación Ayacucho 815 Dpto 501 Torre I San  
Miguel Lima Perú.  
Teléfono: + 51 - 1 - 2843445



**Lote N°.**

**F. de Form.**

**F. de Venc.**

**Contenido Neto: 500 mL**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

EXTINTHOR 50 EC esta formulado por el ingrediente activo: Profenofos, que es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, con efecto translaminar.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cuadro de usos:

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Cil)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.375	14	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.  
PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar EXTINTHOR 50 EC hasta tres (03) aplicaciones como máximo, considerando dos campañas al año y una frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

EXTINTHOR 50 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

