

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- 0Este producto es dañino, no ingerir.
- 0Causa irritación moderada a los ojos.
- 0Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- 0Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- 0No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- 0No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- 0Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- 0Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- 0Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- 0Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Organophosphate

- 0En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- 0En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- 0En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- 0En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- 0En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- 0ANTÍDOTO: Sulfato de Atropina: vía endovenosa o intramuscular.
- 0Antes de administrar Atropina debe procurarse una oxigenación adecuada para reducir el riesgo de arritmias cardíacas.
- 0La dosis inicial recomendada de Atropina varía de 1 a 4 mg en adultos, y 0.02 mg/kg en niños, por vía intravenosa.
- 0Cada cinco minutos debe verificarse si aparecen signos de atropinización (midriasis, sequedad de la piel y mucosas) objetivo de la terapia. En caso que no se observen estos, la dosis debe duplicarse, cada cinco minutos, hasta la atropinización.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- 0CICOTOX: 0800 -13040.
- 0CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- 0Después de usar el contenido, enjuaguese tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- 0Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- 0Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- 0Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- 0Peligroso para organismos acuáticos.
- 0No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- 0No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- 0Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- 0Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- 0El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- 0El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- 0En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

EXTINTHOR

50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Profenofos 500 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 2324 - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.

Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: + 51 -1 - 222-2795



Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 – 87301088

Importado y Distribuido por:

SANIVEG PERU S.A.C.

Prolongación Ayacucho 815 Dpto 501 Torre I San
Miguel Lima Perú.
Teléfono: + 51 - 1 - 2843445



Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Contenido Neto: 20 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EXTINTHOR 50 EC esta formulado por el ingrediente activo: Profenofos, que es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, con efecto translaminar.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de usos:

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Cil)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Cebolla (Allium cepa)	Trips	Thrips tabaci	0.375	14	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar EXTINTHOR 50 EC hasta tres (03) aplicaciones como máximo, considerando dos campañas al año y una frecuencia entre aplicaciones de 7 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EXTINTHOR 50 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxica a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

