

16.00 centímetros

Rastrex®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES- WG

COMPOSICIÓN

Halosulfuron methyl.....750 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N°2325 - SENASA

Titular de Registro:
FARMEX S.A.

Formulado por:
UPI CROPSCIENCE CO., LTD.
C-313 Hi-tech Information Plaza, Huayuan, Tianjin,
300384 P.R. China
Teléfono: +86 22 23707852

CONTENIDO NETO:
500 gramos

Importado y distribuido por:

Lote N°:
F. Fab.:
F. Venc.:



Calle Dean Valdivia 148. Piso 7.
San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630 6410
www.farmex.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

20.00 centímetros

16.00 centímetros

20.00 centímetros

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sulfonylurea.
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia:
Infosalud: 0800-10-828, CISPROMQUIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RASTREX es un herbicida selectivo y de acción sistémica para el control postemergente de malezas de hoja ancha y ciperáceas. Es absorbido tanto por el sistema radicular como por la superficie de las hojas y luego es trasladado a los tejidos meristemáticos donde actúa inhibiendo la biosíntesis de los aminoácidos esenciales valina e isoleucina, deteniendo la división celular y el crecimiento de las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar RASTREX una (01) aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de aquellos con reacción alcalina. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD:

RASTREX no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGA		Dosis (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Coquito	Cyperus rotundus	0.08	48	0.05
	Coquito o coco	Cyperus esculentus			

P.C. = Periodo de carencia (días), L.M.R = Limite máximo de residuos en partes por millón

