9. PROYECTO DE ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA (Cuando corresponda)

A continuación se presenta el arte de etiqueta de 1 kg y la hoja infomativa. Las otras presentaciones se presentarán cuando estás sean aprobadas.

34 cm x 32 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No usar la semilla tratada con CARBONYL para consumo humano o animal.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Phtalamida y Oxathiina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO:
No hay antídoto especifico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 0801- 10- 200
CAISAC: 01- 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CARBONYL , es un fungicida sistémico y de contacto que protege de los hongos patógenos que atacan a la semilla, durante la germinación y emergencia.

CARBONYL es un polvo que no necesita preparación previa para aplicarlo. Antes del proceso de impregnación de las semillas los operadores deberán utilizar equipo de protección personal: Guantes, mascarillas, anteojos, camisa de manga larga, pantalones largo.
Se aplica manualmente espolvoreando el fungicida sobre las semillas húmedas, para luego mezclarlo hasta conseguir una impregnación uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se aplica 1 sola vez por campaña, espolvoreando sobre las semillas previamente humedecidas antes de la siembra.

Solo aplicarlo sobre la semilla, siguiendo las indicaciones recomendadas en esta etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO
No aplica porque las semillas quedan enterradas 5 cm debajo de la superficie del suelo, por lo tanto se puede reingresar inmediatamente después de la siembra.

COMPATIBILIDAD
CARBONYL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se usa de acuerdo a lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Frijol	Chupadera fungosa	*Rhizoctonia solani*	0.20 kg/ha (4 g de carbonyl/kg de semilla)	N.A	0,2

LMR: Límite máximo de residuos en ppm. **PC:** periodo de carencia en días. **N.A.** No aplica porque se emplea antes del momento de la siembra.

CARBONYL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE – WP

Composición:
Captan .....200 g/kg
Carboxin .....200 g/kg
Aditivos .....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por :
Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd
No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang
District, Shanghai, China.

Contenido Neto: 1kg

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CARBONYL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE – WP

Composición:

Captan .....200 g/kg
Carboxin .....200 g/kg
Aditivos .....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Presentación del producto: 100 g, 250 g; 500 g, 1 kg.
Grupo químico: Phtalamida y Oxathiina
Nombre químico:
Captan:(3aR,7aS)-2-[(trichloromethyl)sulfanyl]-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Carboxin: 2-Methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-carboxamid

Captan:
Formula: C9H8Cl3NO2S
Peso molecular: 300,59 g/mol.



Carboxin:
Fórmula: C12H13NO2S
Peso molecular: 235,3 g/mol.



Propiedades físicas y químicas del producto formulado
Apariencia: Solido (gránulos)
Color: blanco-plomo,
Olor: ligero olor.
pH: 5.0-8.0

Titular del registro, importador y distribuidor:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por :

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd
No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang
District, Shanghai, China.

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No usar la semilla tratada con CARBONYL para consumo humano o animal.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar en lugares bien ventilados y sin exposición a fuentes de ignición ni irradiación.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Nota al médico:
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico.
El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 0801-10200 / CAISAC: 01-253 - 6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CARBONYL , es un fungicida sistémico y de contacto que protege de los hongos patógenos que atacan a la semilla, durante la germinación y emergencia.

CARBONYL es un polvo que no necesita preparación previa para aplicarlo.
Antes del proceso de impregnación de las semillas los operadores deberán utilizar equipo de protección personal: Guantes, mascarillas, anteojos, camisa de manga larga, pantalones largo.
Se aplica manualmente espolvoreando el fungicida sobre las semillas húmedas, para luego mezclarlo hasta conseguir una impregnación uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se aplica 1 sola vez por campaña, espolvoreando sobre las semillas previamente humedecidas antes de la siembra.
Solo aplicarlo sobre la semilla, siguiendo las indicaciones recomendadas en esta etiqueta.

PERIODO DE REINGRESO
No aplica porque las semillas quedan enterradas 5 cm debajo de la superficie del suelo, por lo tanto se puede reingresar inmediatamente después de la siembra.

COMPATIBILIDAD
CARBONYL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se usa de acuerdo a lo indicado en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Frijol	Chupadera fungosa	*Rhizoctonia solani*	0.20 kg/ha (4 g de carbonyl/kg de semilla)	N.A	0,2

LMR: Límite máximo de residuos en ppm. **PC:** periodo de carencia en días.
N.A. No aplica porque se emplea antes del momento de la siembra.