

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora. Puede causar una moderada pero temporal irritación de los ojos.
- Durante la aplicación, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- **No almacenar Serifel® a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 25°C. Proteger el producto de la luz directa.** Se pueden modificar las propiedades del producto, si el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas fuera del rango recomendado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de inhalación: Reposo, respirar aire fresco.

En caso de contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

En caso de ingestión: Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana S.A.: 513 2505

ESSALUD: 080110200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, ríos o fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Serifel®

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

FUNGICIDA BACTERICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Bacillus amyloliquefaciens (cepa MBI 600) 110 g/kg

(contiene no menos de 5.5×10^{10} esporas viables por gramo)

Aditivos c.s.p 1 kg

Reg. PBUA N° -SENASA

TITULAR DEL
REGISTRO, IMPORTADO
Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915
– Callao Casilla 3911,
Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: ((01) 513 2519



FORMULADO POR:

BASF Corporation.
801 Dayton Avenue, Ames,
Iowa, 50010, Estados
Unidos

Contenido Neto: 10 kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Serifel® es un fungicida y bactericida biológico que contiene la cepa MBI 600 de *Bacillus amyloliquefaciens*,

Llenar el tanque a 3/4 de su capacidad con agua, adicionar la cantidad recomendada de **Serifel®**, completar el tanque con agua limpia y no clorada y mantener el caldo con agitación continua durante toda la preparación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)
	Nombre común	Nombre científico	kg/Ha	kg/ cil 200 L	
Arroz	Añublo bacterial de la panícula de arroz	<i>Burkholderia glumae</i>	0.5– 0.6	-	N.A.
Cacao	Moniliasis	<i>Moniliophthora roreri</i>	0.5	-	N.A.
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.5	-	N.A.
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	-	N.A.
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.5– 0.6	-	N.A.

PC: Período de carencia N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **Serifel®** de manera preventiva o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la enfermedad. Se puede repetir la aplicación en caso de ser necesario, en rotación o mezcla de otros fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: No aplica por ser un producto biológico.

COMPATIBILIDAD: **Serifel®** puede ser mezclado en un tanque con otros fungicidas, fertilizantes o insecticidas registrados, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos. Se debe evitar la preparación de la mezcla en aguas cloradas. **Serifel®** es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



PRECAUCIÓN

