# TRIPTON COMBI 75WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN:**

Trifloxystrobin ..... 250 g/kg
Tebuconazole ..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Registro Nacional PQUA N° 2334 SENASA**

**Titular del Registro:**
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: +51-1-222-2795

**Formulado por:**
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574–87301088

**Importado y Distribuido por:**
**AGROINDUSTRIAS LA CAMPIÑA S.A.C**
Av. Hipolito Unanue Nro.317-Urb.La Colonial
-Prov. Const. Del Callao-Peru
Teléfono: +51-1-408-2006 / 962692366 / 977191952

Nº Lote
F. de Form.
F. Venc.

**CONTENIDO NETO: 500 gr.**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Strobilurin y Triazole
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llamé al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX: 0800-13040 / ESSALUD: 0801-10200 PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C.: 222-2795**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
-Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TRIPTON COMBI 75 WG** es un fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y erradicante. Actúa interfiriendo la síntesis de ergosterol e inhibiendo la respiración celular de los hongos.

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del fungicida **TRIPTON COMBI 75 WG** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo | Plaga | | Dosis kg/Ha | P.C. | L.M.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Vid (*Vitis vinifera*) | Oidiosis | *Erysiphe necator* | 0.30 | 14 | *3.0<br>**6.0 |

P.C.: Periodo de carencia (días)
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)
* Trifloxystrobin
** Tebuconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
Aplicar **TRIPTON COMBI 75 WG** en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo. Aplicar máximo 2 aplicaciones por campaña y 2 campañas por año, con un intervalo entre aplicación de 10 a 15 días dependiendo de la presión de infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**
Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:**
Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. Evite el contacto con ácidos fuertes.

**FITOTOXICIDAD:**
**TRIPTON COMBI 75 WG** no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
"El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y hoja informativa adjunta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".