

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (Aspersión).
- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderado a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole + strobilurin

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No posee antídoto específico. Realizar tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801- 10-200
CICOTOX: 080013040Y (01)328-7398 / CAISAC: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora Silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto debe ser recopilados inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

RE-FLASH

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspension emulsion - SE

COMPOSICIÓN:

Pyraclostrobin 133 g/L
Epoxiconazole 50 g/L
Aditivos C.S.P 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro, importado y distribuido por



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Nanjing Rhonquim Co., Ltd.
No.26 Majia Street, Nanjing, China
Telephone: +86-25-52621629

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto: 20L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RE-FLASH es un fungicida sistémico de efecto preventivo, curativo y erradicativo. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol y la respiración mitocondrial, deteriorando las células y el desarrollo del hongo. Se aplica en solución con agua, agregar la dosis recomendada de RE-FLASH y completar con agua, agitar hasta lograr una mezcla homogénea antes de llenar los equipos de aplicación.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphyllum vesicarium</i>	0.5	30	*0.02 **0.05

PC: Período de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

*Pyraclostrobin
**Epoxiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar RE-FLASH en época de formación del fruto y cuando se observe los síntomas y signos de la plaga en el cultivo. Se recomienda una aplicación por campaña, con dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, pero hay que tener cuidado con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

RE-FLASH no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

