

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398**  
**Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)**  
**ESSALUD: 0801-10200 CISPROMQUIM: 0800-50847**

- En caso de ingesta provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: Tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritación ocular: Pomadas o colonias oftalmológicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, inutilicelo triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos con capa freática superficial.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (g/cil 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Hielo fungoso o ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	28	0.1
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>			
Tomate	Hielo fungoso o ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	400 - 500	10	2
	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria solani</i>			
Naranja	Podredumbre gris de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	400 - 500	28	2
Algodonero	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria tenuis</i>	400 - 500	28	2
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	400 - 500	28	0.2
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	600 - 800	28	0.1
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>			
Pimiento	Mancha foliar	<i>Alternaria solani</i>	750	7	2
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>			
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	2
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	750	14	2

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**NOVAZEB 80 PM** es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos. Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por último complete con agua el recipiente y continúe agitándolo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar la aplicación cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

**NOVAZEB 80 PM** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

# NOVAZEB

## 80 PM

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**Composición:**

Mancozeb ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... csp 1kg

**Reg PQUA N° 486 - SENASA**

Titular del Registro:

**SHARDA PERU S.A.C**

Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso.  
Of. 702. Edificio Del Park II.  
Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**SHARDA CROP-CHEM LIMITED**

Prime Business Park, Dashrathlaj  
Joshi Road, Vile Parle (W),  
Mumbai - 400 056 - INDIA  
Telf: (91) 22 6678 2800  
Fax: (91) 22 6678 2828

**Contenido Neto: 25 Kg**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**



**EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

