

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TOQUI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)****COMPOSICIÓN:**

Trifloxystrobin	250 g/kg
Tebuconazole	500 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2350 SENASA**Titular del Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L**

Jirón Luis N. Sáenz 348 Int. 101 - Jesús María - Lima

Teléfono: 920534766

Formulador:**JINGBO AGROCHEMICALS**

JINGBO AGROCHEMICALS TECHNOLOGY CO., LTD.

Economic Development Zone, Boxing

County, Shandong Province, China

Tel. +0086-543-2510786

Fax. +0086-543-2510096-865.

Distribuidor:**hortus****HORTUS S.A.**

Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.

Telf.: 717-9040 / 717-9041 - Fax: 718-8684

R.U.C. 20101637221

www.hortus.com.pe**Fecha de Formulación:****N° de Lote:****Contenido neto: 250 g.****Fecha de vencimiento:****NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primas 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al centro medico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Teléf. del titular: 920534766

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.3-0.375	14	*3.0
	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.375		**6.0
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	30	*1.0 **0.6
Ají Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.250	3	*0.4 **0.6

P.C.: Periodo de carencia (días)

* Trifloxystrobin; * Tebuconazole

L.M.R.: Limite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para la aplicación de **TOQUI** el suelo debe estar en capacidad de campo. La planta debe estar turgente. No debe haber humedad sobre la lámina foliar.

Para el cultivo de Vid aplicar **TOQUI** máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 1 campaña por año, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo y cultivo.

Para el cultivo de Alcachofa y Páprika aplicar **TOQUI** máximo 1 vez por campaña considerando 1 campaña por año. Dirigir las aplicaciones directamente a las hojas.

