

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al centro medico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta”

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FSR CONSULTORES E.I.R.L.: 920 534 766

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200L		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.3 - 0.375	-	14	*3.0 **6.0
	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.375	-		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	-	30	*1.0 **0.6
Ají Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25	-	3	*0.4 **0.6
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25	-	35	*5 **1.5
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	-	0.06	60	*0.01 **0.05
Arándano	Oidiosis	<i>Oidium sp.</i>	-	0.075 - 0.1	1	*3 **1.5

P.C.: Periodo de carencia (días)

* Trifloxystrobin; ** Tebuconazole

Gasto de agua en alcachofa: 200 a 600 L/Ha

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

